

16. HYOSÉRIDE de Mauritanie. *Hyoseris mauritanica*.

*Hyoseris caule erecto, ramoso; foliis oblongis, subdentatis, subcordatis, amplexicaulibus; squamis calicis fructigeri alternis, apice subsetosis.* Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1616. Sub *hedypnoide*.

Ses tiges sont très-glabres, droites, rameuses, hautes d'un demi-pied, légèrement hispides à leur base; les feuilles radicales lancéolées, rétrécies à leur base, à dentelures écartées; les caulinares lancéolées, en cœur, amplexicaules, médiocrement dentées, glabres à leurs deux faces, munies, à leurs bords, de poils courts, sétacés; les pédoncules alongés, filiformes, uniflores, un peu renflés sous les fleurs; le calice caliculé, anguleux; les écailles glabres; les alternes munies, sous leur sommet, de quelques poils courts, sétacés; le petit calice extérieur très-court; la corolle jaune, composée, à sa circonférence, de six à huit demi-fleurons, presque nuls dans les fleurs du centre; le sommet des étamines violet; l'aigrette des semences extérieures dentée, avec une ou trois arêtes vers le bord extérieur; les semences du centre pourvues de soies capillaires extérieures, très-courtes; les semences plus intérieures surmontées de paillettes plus longues.

On soupçonne cette plante originaire de la Mauritanie. ☉ (*Willd.*)

17. HYOSÉRIDE pendante. *Hyoseris pendula*. Balb.

*Hyoseris caule erecto, paniculato; foliis oblongis, hispides, profundè dentatis; squamis calicis fructigeri glabris, apice muricato-setosis.* Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1618. Sub *hedypnoide*.

Cette espèce se rapproche de l'*Hyoseris cretica* par ses tiges droites, par ses feuilles plus hispides, plus profondément dentées. Ses tiges sont hautes d'environ un pied & demi, feuillées, paniculées à leur partie supérieure, hérissées, ainsi que toutes les autres parties de la plante, de poils fourchus; les feuilles inférieures en ovale renversé, roncinnées, dentées; les supérieures alongées, amplexicaules, profondément dentées; les pédoncules renflés; les fleurs solitaires, pendantes avant leur épanouissement; les calices caliculés, alongés; les écailles glabres, munies, à leur sommet, de poils sétacés.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. ☉ (*Willd.*)

18. HYOSÉRIDE naine. *Hyoseris nana*.

*Hyoseris scapis unifloris, brevissimis; foliis subglabris, oblongo-lanceolatis, lyrato-runcinatis, acutè dentatis; floribus minimis.* (N.)

Cette plante est remarquable par sa petitesse.

Ses racines sont grêles, un peu fusiformes, fibreuses; elles produisent des feuilles toutes radicales, étalées, oblongues, lancéolées, étroites, roncinnées & en forme de lyre, un peu blanchâtres & pubescentes en dessous dans leur jeunesse, d'un vert-tendre & très-glabres dans leur vieillesse, à peine longues de deux pouces; les lobes un peu anguleux, arrondis, munis de quelques dents aiguës; les hampes très-simples, radicales, pubescentes & blanchâtres, longues à peine de six lignes, terminées par une seule fleur fort petite; le calice caliculé; les folioles du calice intérieur droites, linéaires, obtuses, très-glabres, vertes, un peu blanchâtres & membraneuses à leurs bords; les écailles du calice extérieur très-courtes, à peine sensibles; la corolle jaune; les demi-fleurons rares, un peu plus longs que le calice. Je n'en ai point vu les semences.

Cette plante croît dans la Calabre. (*V. s. in herb. Desfont.*)

\* Espèces douteuses ou moins connues.

\* *Hyoseris (grumosa), radice fasciculata, scapis unifloris; foliis runcinatis, hirtis; pilis bi-trifurcatis; calice sapius piloso, subtoruloso.* Pers. Synops. Plant. 2. pag. 368. Sub *thriniciâ*. — Broter, Flor. lusit. 1. pag. 325. In agris subarenosis Lusitania.

\* *Hyoseris (pygnea), scapis unifloris; foliis spathulatis, dentatis, ciliatis; calicibus pilosis; pilis ciliis furcatis; pappo stipitato, plumoso.* Ait. Hort. Kew. 3. pag. 103. In Maderâ. ☉

\* *Hyoseris (aculeata), caule ramoso, folioso; foliis radicalibus lanceolato-oblongis, sinuatis, subciliatis; caulinis amplexicaulibus, pedunculis aequalibus, calicis squamis aculeato-hispidis.* Pers. Synops. Plant. 2. pag. 369.

*Leontodon protheiforme.* Balb. In Pyreneis? *Caulis ferè pedalis, dichotomus.*

HYOSERIS. (*Voyez HYOSÉRIDE.*)

HYPÉCOON. *Hypocoum*. Illustr. Gen. tab. 88, *hypocoum procumbens*, n°. 1.

*Observations.* Jacquin a présenté une nouvelle espèce d'*hypocoum*, sous le nom d'*hypocoum (littorale)*, *siliquis articulatis, compressis, arcuatis; petalis integris; exterioribus longioribus, linearispathulatis.* Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 309, & Collect. 2. pag. 205. Cette plante a tant de rapport avec l'*hypocoum procumbens*, qu'elle pourroit bien n'en être qu'une variété; elle en diffère seulement par ses folioles plus courtes, à dentelures aiguës; par la corolle plus pâle & les pétales entiers; les deux extérieurs plus longs que les autres, linéaires, spatulés & non trilobés.

Cette plante croît en Autriche, le long des rivages, dans les plaines arides & sablonneuses. ☉