

viagg. Creta p. 71. — Exsicc.: Heldr. pl. gr. n. 1474, herb. norm. n. 1661; Rev. pl. cret. n. 93, in Baen. herb. europ. n. 4860; Dörf. fl. aeg. n. 50.

Perenne, glaucovirens; caulibus nanis, a basi intricatim ramosissimis, ramis demum apice spinescentibus; foliis radicalibus rosulatis, sinuato-dentatis vel pinnatifido-lyratis, caulinis linearibus, saepius integris; capitulis in dichotomiis sessilibus, solitariis, rarius 2—3 aggregatis, terminalibus paucis, in apice ramulorum non incrassatorum insidentibus; involucri glabriusculi phyllis externis ovatis, obtusis, internis linearibus, triplo longioribus; pappo setoso-subpaleaceo, achenio 8—10 plo brevior.

In saxosis et arenosis maritimis. Attica: pr. Eleusis, Megara (Sprun.), ad Phalerum, pr. Laurion (Haussk.); in isthmo Corinthiaco pr. Kalamaki, Corinthus; insula Metopi pr. Aegina (Heldr.); Cycladum insula Syra (Weiss), Naxos (Leon.), Tenos, Mykonos (Heldr.); Laconia: a Marathonisi usque promontorium Tenare (Chaub.); Creta: pr. Canea (Tourn. voy. p. 10), Kissamos (Rev.), Khalepa, Suda, Askyphos, insula Gaidaronisi (Raul.); Cythæra: pr. Kapsali, San Nicolo (Spreitz.); Cephalonia: pr. Drapano (Heldr.). — Jun. Aug. 2.

2 × 3. **C. pumilum** × **spinosa**. — *C. hybridum* Heldr. herb. gr. norm. n. 1662. — Habitu inter parentes intermedia, a *C. pumilo* caulibus intricatim ramosissimis, ramulis demum non incrassatis, capitulis paucifloris; a *C. spinosa* radice annua, caulibus elatioribus, ramulis vix spinescentibus differt. Achenia abortiva. — In oropedio Anoraera insulae Mykonos Cycladum, inter parentes (Heldr.). —

70. **Hyoseris** L. gen. n. 916.

1. **H. radiata** L. sp. p. 808; Weiss in z. b. G. 1869 p. 46. — Huc probabiliter: *H. lucida* Sieb. avis p. 5; Ch. et B. exp. p. 237, Fl. pelop. p. 55; vix L. mant. p. 103, quae calyculo biseriali, involucri fructifero erecto, nec stellatim expanso et foliorum segmentis imbricatis integris obtusioribus a *H. radiata* distinguitur. — Icon: Rchb. t. 9, f. 1. — Exsicc.: Dörf. fl. aeg. n. 19.

Perennis; radice crassa verticali; foliis radicalibus, rosulatis, glabris vel ciliatis, saepe pulverulentis, in segmenta rhomboidea, dentata vel incisa runcinatim pinnatifidis; scapis monocephalis, folia superantibus, fructiferis vix incrassatis; calyculi squamis involucri triplo brevioribus; involucri phyllis oblongo-linearibus, fructiferis stellatim expansis; acheniis marginalibus compressis, exalatis, oblongo-linearibus, striatis, pappo paleolato brevissimo, ceteris oblongo-linearibus, late alatis, costatis, margine scabris, pappo radiis numerosis, aliis setiformibus, aliis basi paleaco-dilatatis constante superatis, intimis anguste linearibus, exalatis. — Planta graeca, saltem illa e Naxos, foliis crassiusculis, glaucovirentibus, segmentis parvis, dentatis, involucri phyllis latioribus et pappi setis basi parum paleaco-dilatatis, magis piliformibus, ab occidentali discedit et subspeciem propriam — *graecam* — sistere videtur.

In arenosis maritimis, cultis regionis inferioris. Cycladum insula Naxos: pr. Haliki (Leon.); Creta: pr. Canea (Weiss); ? Peloponnesus: pr. Pylos, Methone, Kalamata, Mavrovuni in Maina (Chaub.), si *H. lucida* Ch. et B. huc spectet. — Mart. Maio. ♀.

2. *H. scabra* L. sp. p. 809; Sieb. avis rem. p. 5; Weiss in z. b. G. 1869 p. 47; Bois. fl. or. III. p. 718, suppl. p. 318; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 714; Heldr. fl. cephal. p. 48, Fl. Aegina p. 308; Haussk. symb. p. 143; Hal. in ö. b. Z. 1895 p. 461. — *H. microcephala* Cass. dict. 22 p. 338; Marg. et R. fl. Zante p. 61; Clem. sert. p. 51; Raul. cret. p. 794. — Icon: Rehb. t. 9, f. 9. — Exsicc.: Dörf. fl. gr. n. 457.

Annua; radice tenui, filiformi; foliis radicalibus, rosulatis, scabriusculis, in segmenta ovata, dentata runcinatum pinnatipartitis; scapis monocephalis, foliis aequilongis vel vix longioribus, clavato-incrassatis; calyculi squamis involucri 5 plo brevioribus; involucri phyllis lanceolatis, fructiferis erecto-conniventibus; acheniis marginalibus compressis, linearibus, exalatis, pappo paleolato brevissimo, ceteris oblongo-lanceolatis, late alatis, costatis, margine scabris, pappo radiis aliis setiformibus, aliis 5 paleaceo-dilatatis constante superatis, intimis linearibus, exalatis.

In cultis, arenosis maritimis, ad vias regionis inferioris. Aetolia: pr. Krioneri ad sinum Patranum (Reiser); Attica: pr. Piraeum (Clem.), Eleusis, Athenas, mt. Lycabettus, pr. Patissia, Kephissia, Phaleron, promontorium Colias, insula Salamis, Aegina (Heldr.); Corinthus: pr. Asso (Heldr.), Acrocorinthus (Haussk.); Peloponnesus (Bois.); Cycladum insula Keos, Kythnos (Tunt.), Syra, Tenos (Weiss), Melos (Leon.); Creta: pr. Sitia (Raul.); Zante (Marg.); Cephalonia: pr. Argostoli (Spreitz.). — Febr. Maio. ○.

71. *Hedypnois* Tourn. inst. p. 478.

1. *H. rhagadioloides* L. sp. p. 809; Ch. et B. exp. p. 257, Fl. pelop. p. 55; (*Hyoseris*); Willd. sp. III. p. 1617; S. et S. pr. II. p. 142, Fl. gr. t. 812. — *H. tubaeformis* Ten. fl. nap. II. p. 173, t. 73; Clem. sert. p. 51, Raul. cret. p. 794; Heldr. fl. Aegina p. 308, chlor. Thera p. 16, chlor. Mykon. p. 247. — *H. cretica* Bois. fl. or. III. p. 719 p. p.; ? Haussk. symb. p. 143. — Exsicc.: Heldr. herb. fl. hellen. 1878.

Setuloso-scabra; caulibus erectis vel diffusis, parce ramosis vel simplicibus; foliis radicalibus rosulatis, obovato-oblongis, sinuato-dentatis vel pinnatifidis, caulinis minoribus, summis lanceolatis, integris; pedunculis fistulosis, fructiferis in tubam insignem ampliatis (diam. 4—6 mm.); capitulis majusculis, globosis; involucri phyllis setoso-hispidis, arcte inter se adpressis; acheniis scabridis, interioribus cum pappo subaequilongo involucrum parum superantibus.

In herbidis, sterilibus aridis, regionis inferioris. Indicatur in Aetolia: pr. Mesolongion (Nied.); Attica: insula Salamis, Pharmacusarum insula Leros, pr. Marathon, Tatoi, Piraeus, Phaleron, Eleusis, mt. Lycabettus,