

Pedunculus & rachis foliorum farinacea. Lobi foliorum imbricatim reflexi utrinque dentati, leves. Semina membranacea. Pappa simplici, sessili.

3. HYOSERIS scapo simplicissimo unifloro: foliis scabris, seminibus papposis. *Hort. cliff.* 386 *Roy. lugdb.* 127.

*Taraxaconastrum*, erysimi folio, flore minimo. *Vaill. act.* 1721. p. 235.

Dens leonis minimus, foliis hirsutis, calycis segmentis a flore delapso erectis & semina complexis. *Raj. suppl.* 147.

*Habitat in Sicilia.*

4. HYOSERIS scapis unifloris, foliis lanceolatis lyratis virginica. glabris. *Gron. virg.* 60. \*

*Habitat in Virginia.*

Folia radicalia prima ovata, tum lanceolata, demum lyrata, acuta, glabra. Scapi nudi, uniflori, foliis triplo longiores. Calyces simplicissimi, nec imbricati, ex decem foliolis lanceolatis. Corolla saturate lutea. Semina tetragona, coronata margine membranaceo integro & insuper setis 3. f. 4. longis.

5. HYOSERIS caule diviso nudo. *Hort. cliff.* 386. *Fl. minima.* succ. 630. *Roy. lugdb.* 127. *Sauv. monsp.* 14.

*Hyoseris angustifolia*. *Tabern. ic.* 180.

*Hieracium minimum*. *Cluj. bist.* 2. p. 142.

*Habitat in Europæ arvis apricis.*

\* *Caule folioso.*

6. HYOSERIS fructibus subglobosis glabris, caule ramoso. *Hedypnois*.

*Lapsana* fructibus subglobosis glabris, seminibus disci calyculato-papposis. *Hort. upf.* 246. \* *Sauv. monsp.* 83.

*Lapsana* calycibus fructus capitatis dehiscentibus, pedunculis incrassatis, floribus nutantibus. *Hort. cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 131.

*Rhagadioloides* calthæ folio, calyce glabro. *Vaill. act.* 1721. p. 202.

*Hedypnois annua*. *Tournef. inst.* 478.

*Habitat in Europa australi.* ⊖

7. HYOSERIS fructibus globosis pilosis, caule ramoso. *Rhagadioloides*.

*Lapsana* fructibus globosis pilosis, seminibus disci calyculato-papposis. *Hort. upf.* 246. \*

*Habitat in Europa australi.* ⊖