

5. LES CHICORACÉES, OU SEMI-FLOSCULEUSES.

* LACTUCA CHAIXI. *Tab. IX. fig. 1.*

Lactuca foliis levibus ; radicalibus lyratis ; caulinis erosis, sagittatis, posticè dentatis ; floribus spicatis.

SONCHUS nitidus.

Sonchus foliis dentato-sinuatis, aveniis ; squamis calicinis nitidis ; caule erecto.

Affinis est Sonchi arvensis LINN.

HEDYPNOIS.

Le calice représente un vrai cone renversé ; & ses écailles se prolongent sur le péduncule. L'aigrette des femences est sessile : le réceptacle est nud.

HEDYPNOIS autumnalis.

Leontodon autumnale LINN. Spec. 1123.

HEDYPNOIS Pyrenaïca.

*Leontodon Pyrenæum. GOU. Illustr. Bot. 55.
tab. XXII.*

HEDYPNOIS Taraxaci. *Tab. XXVI. fig. 3.*

Hieracium Taraxaci LINN. 1125.

Hedypnois foliis ligulatis, integris & pinnatifidis longitudine scapi ; calice lanato ; radice præmorsâ.

HYOSERIS Taraxacoides. *Tab. XVIII. fig. 3.*

Leontodon saxatile Juss.

Hyoseris foliis sinuato-dentatis : feminum centra- lium pappis plumosifis ; pilis foliorum furcatis ; radice fibrosâ.