

N.<sup>o</sup> 8620. **Centranthus Calcitrapa** D C.var. *Donati* Sennen.

Folia obovatifolia longe petiolata, superiora plus minusve lacinata, corolla tubus perspicuus calcaratus akæniis brevioribus; semina puberula rostrata 2 mill. l. pappi lanato longe plumosa.

Hab.—Baléares: Manacor, à Porto Cristo.

N.<sup>o</sup> 8621. **Hyoseris Knochœi** Sennen.= *H. radiata* × *scabra* ej. *Inter parentes*.

Petiola ac scapi puberulenti, limbus glaber; scapus longus in-crassatus apicen versus; involuci bracteæ exteræ 4-5 mill.

Hab.—Baléares: Marratxi, garrigues.

N.<sup>o</sup> 8628. **Centaurium Bianoris** Sennen.= *C. maritimum* × *Hermannii* an *C. marit.* var.

Folia breve acuminata aculeata; flora interdum rosea calyx typo valde longior, 15 mill. l. et ultra.

Hab.—Baléares: Bellver, sites herbeux.

Legit F. Bianor.

N.<sup>o</sup> 8633. **Anemone Losæ** Sennen.X an *A. Pavoniana* Boiss. var. F. Q. et Sennen.

Caules florales breves ac foliorum petiolos valde hirsuto-lanatos; foliorum limbus triternatus multi dissectus subglaber cuspide lobulorum longe piloso; foliorum paria una procul flore terminales inserta sepalis cuspide plus minusve lobulatis vel integris, intus glabris dense venulatis, extus reticulato-sulcato-villoso-adpressis.

Hab.—Alava: Pipaon, Recella, 1000 m.

Leg. Dr. Losa.

N.<sup>o</sup> 8625. **Euphorbia dendroides** L.var. an fa. *longeradiata* Sennen.

Umbella 6-9 longeradiata, floris longepedicellatis, folia involucralia oblonga a foliis ramealis superantibus.

Hab.—Baléares: Lluch, escarpements calcaires, 600 m.

N.<sup>o</sup> 8626. **Euphorbia medicaginea** Boiss.fa. an var. *balearica* Sennen.

Elasta ramosa ramis erectis densifoliatis; folia imo minuta obovata retusa ceteris oblongis profundis retusis atque involucralia, umbellis 5-radiatis dichotomis, bracteis late ovalis retusis.

Hab.—Baléares: Marratxi, à S. Marcial coteaux en friche.