

liformibus et caducis. — *Herba perennis, glaberrima, glauca, Americae borealis, superne parum foliata, 2—3. cephala, foliis imis lyratis, superioribus semiamplexicaulis et integerrimis; capitulis luteis; involucris biserialibus.*

*C. virginica* Don = *Tragopogon virginicus* L. = *Hyoseris prenanthoides* W. Krb. N. 14779. — *Adopogon* Neck. elem. I. 56.

## SUBTRIB. IV. HYPOCHOERIDAE.

Rhachis bracteolata. Pappus paleaceus, paleis angustissime semilanceolatis saltem interioribus et in achaeniis interioribus pinnatisectis.

1. *Hypochoeris* L. ex parte, Gaertn., Scop. (= *Seriola* Cass. Dict. sc. nat. XLVIII. 504. nec. L.) Achaenium rostratum, rostro in achaeniis extimis brevissimo \*), in reliquis elongato. Pappus biserialis, serie interiori plumosa, exteriori subsetacea, breviori. — *Herbae annuae, glabriuscule, dichotomae, Europae vel Africanae tantum basi foliatae, involucris imbricatis.*

1) *H. glabra* L. Gaertn. l. c. II. p. 374. tab. 160. f. 4. 2) *H. capensis* \* = *Hyoseris tenella* Thunb. fl. cap. p. 613!

2. *Achyrophorus* Scop., Gaertn. Achaenium rostratum, conforme. Pappus biserialis, serie interiori plumosa, exteriori subsetacea et breviori. — *Herbae Europaeae vel Asiaticae perennes, pl. tantum basi foliatae, involucris imbricatis.*

*A. radicatus, maculatus et helveticus* Scop. (= *Hypochoeris radicata, maculata et helvetica* L.) — *Achyrophorus roseus* Linnaea V. 133 est generis et subtribus diversae. cf. *Hieracieas*.

3. *Seriola* L. Achaenium rostratum conforme. Pappus conformis, uniserialis, paleis anguste semilanceolato-linaribus, plumosus, plumalis hinc inde caducis. — *Herbae regiones Mediterraneas incolentes, magis minusve hirsutae et dichotomae pl. annuae, capitulis luteis.*

*S. aetnensis* Gaertn. l. c. II. p. 370. tab. 159. f. 5. (num etiam Linnaei?), *S. cretensis* etc. — *Porcellites* Cass. Dict. sc. nat. XLIII. 42. est ex parte idem genus ac *Seriola* et ex parte idem ac *Achyropho-*

\*) Sed nihilominus non manifesto.