

in mehreren Reihen, federförmig, gleichförmig; Hüllblätter in einfacher Reihe — *Tr. pratensis*, Hüllblätter länger als die Blumen, Stängel rund, Blätter linienförmig, die Achseln nackt. Gemein.

*Apargia*. (220. *Oporina Don.*) Achenien rund, querrunzelig, nach oben verjüngt; Samenkronen in einfacher Reihe, die Strahlen am Grunde blattartig, dann federförmig. Hüllblätter schuppig, in mehreren Reihen. — *A. autumnalis*, Stängel ästig, niedergelegt; Blumenstiele schuppig; Blätter fiederspaltig gezähnt, glatt; Hüllblätter feinhaarig. In Gebüsch.

*Leontodon*. (220.) Achenien wie bei *Apargia*, aber die Samenkronen in doppelter Reihe, die äußere Reihe bloß haarig, die innere wie bei *Apargia*. Hülle wie *Apargia*, aber der Schaft bloß einköpfig. — *L. hispidus*, Wurzelblätter schrootzählig, rauh; die Haare gabelig. An Gräben und Sümpfen.

*Thrinchia*. (220.) Wie Vorige, aber die äußeren Achenien mit einfacher, die inneren mit mehrfacher Reihe der Kronenhaare, die äußeren haarig, die inneren wie bei *Apargia*. Hüllblätter in einfacher Reihe, am Grunde mit kleinen Schuppen; Schaft bloß Blumen tragend; Blätter bloß an der Wurzel. — *Th. hirta*, Hüllblätter ziemlich glatt; Blätter lanzettlich, buchtig gezähnt, rauh; Haare gabelig. Auf trocknen Wiesen.

4. *Hypochaerideae*. Fruchtboden mit Spreublättern; Samenkronen aus Spreublättern gebildet, wovon die inneren fiederspaltig getheilt sind.

*Achyrophorus*. Achenien gleichförmig, geschnäbelt; Hüllblätter zahlreich, schuppig. — *A. radicans*, Stängel ästig, blattlos, glatt; Blätter länglich, schrootzählig, rauh. Blumenstiele schuppig. An Wegen, gemein.

*Hypochaeris*. (225.) Achenien ungleich, die äußeren sehr kurz, die inneren lang geschnäbelt; Hülle der Vorigen. — *H. glabra*, Stängel ästig, blätterig, glatt; Blätter buchtig gezähnt; Hülle länglich. Auf Feldern, häufig.

*Seriola*. (224.)

5. *Hyoserideae*. Fruchtboden ohne Spreublätter; Samenkronen aus vielen ungetheilten, oft kurzen, Spreublättern gebildet. Blumen meistens blau.

*Cichorium*. (226.) Achenium ungeschnäbelt, turbanartig, mit kurzer Krone in doppelter Reihe. Hüllblätter in 2 Reihen, die äußeren abstehend. — *C. Intybus* (Endivie), Stängel ästig, Blätter unregelmäßig gezähnt, Blüthenköpfe je 2 in den Blattachseln. An Wegen.

*Arnoseris*. (224.) Achenium kantig, nach unten verjüngt, mit kurzer, ungetheilter, lederartiger Krone. Hüllblätter in einfacher Reihe. — *A. pusilla*, Stängel einfach, nackt; Blumenboden kolbig, hohl; Blätter länglich eiförmig, gezähnt, bloß an der Wurzel. Auf Feldern.

Hierher: *Hyoseris* (224.), *Catananche* (226.), *Talpis*, *Cynthia* u. a.