

810 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

caerula.

8. HYOSERIS fructibus ovatis scabris, caule ramoso.  
Lapsana fructibus ovatis scabris, seminibus disci calyculo-pappulis. *Hort. ups.* 246. \*  
*Habitat in Creta.*

HYPOCHÆRIS.

serot.

1. HYPOCHÆRIS foliis dentatis, caule ramoso folioso, calycibus hispidis. †  
Hypochæris hieracii barbati folio, calyce hispido. *Vaill. act.* 1721. p. 215.  
Hieracium alpinum, dentis leonis folio acuto piloso proficillo, capitulis pungenti lanugine oblitis. *Cup. cath.* 95. *Raj. suppl.* 146.  
*Habitat in Sicilia.*  
Calycis squamæ asperæ spinulis pungentibus.

Achyrophor.

2. HYPOCHÆRIS calycibus æqualibus hispidis. *Hort. cliff.* 385. \* *Hort. ups.* 240. \*  
Achyrophorus fere glaber, bellidis glauco-dentatoque folio. *Vaill. act.* 1721. p. 278.  
Hieracium ramosum, floribus amplis, calycibus valde hirsutis, foliis oblongis obtusis: dentibus majoribus inæqualibus incisis. *Raj. suppl.* 144.  
*Habitat in Creta.* ☽

pontana.

3. HYPOCHÆRIS foliis lanceolatis dentatis, caule simplici folioso unifloro.  
Hypochæris non ramosa, endiviæ folio prælongo, morvanthos. *Vaill. act.* 1721. p. 215.  
Hieracium latifolium pontanum præaltum glabrum, endiviæ folio. *Bocc. mus.* 2. p. 148. t. 113. *Raj. suppl.* 142.  
*Habitat in Sabaudia montibus.*

maculata.

4. HYPOCHÆRIS caule subnudo: ramo solitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. *Hort. cliff.* 385. *Fl. suec.* 621. *Roy. Ingab.* 125. *Dalib. paris.* 239.  
Hypochæris hirsuta, endiviæ folio, magno flore. *Vaill. act.* 1721. p. 375. *Fl. lapp.* 283.  
Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum, flore magno. *Bauh. pin.* 128.  
Hieracium latifolium 1. *Clus. hist.* 2. p. 139.  
Hieracium alpinum, foliis dentatis, flore magno. *Bauh. pin.* 128. *prodr.* 65. *Hall. belv.* 760. t. 24.  
*Habitat in Europæ frigidioris pratis asperis.* 2

5. HY-

822. HYPOCHOERIS. \* 1711. *Vaill. A. G.* 28.21. *Achyrophorus Vaill. A. G.* 1721. 52. 28.

13. 21. 18.

CAL. *Communis* imbricatus, basi ventricosus: squamis lanceolatis, acutis.COR. *Composita* imbricata, uniformis: corollulis hermaphroditis æqualibus, numerosis.*Propria* monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinque-dentata.STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata.PIST. *Germen* infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, longitudine flaminum. *Stigmata* duo, reflexa.PER. nullum. *Calyx* connivens, globoso-acuminatus.

SEM. solitaria, oblonga, desinentia in stipitem subulatum pappigerum.

REC. *Paleis* laccolato-linearibus, seminum longitudine, seminibus interpositis.OBS. Hypochœris V. *Calyx subrotundus, totus imbricatus; Pappus plumosus.**Achyrophori* V. *Calyx oblongus, basi medio imbricatus; Pappus simplex.*