

- retica.* 8. HYOSERIS fructibus ovatis scabris, caule ramoso.
Lappana fructibus ovatis scabris, seminibus disci calyceu-
lato-papposis. *Hort. ups.* 246. *
Habitat in Creta.

HYPOCHÆRIS.

- xrens.* 1. HYPOCHÆRIS foliis dentatis, caule ramoso folio-
so, calycibus hispids. †
Hypochæris hieracii barbati folio, calyce hispido. *Vaill.*
act. 1721. p. 215.
Hieracium alpinum, dentis leonis folio acuto piloso pro-
ficiffo, capitulis pungenti lanugine oblitis *Cup. cath.*
95. *Raj. suppl.* 146.
Habitat in Sicilia.
Calycis squama aspera spinulis pungentibus.
- Achyrophor.* 2. HYPOCHÆRIS calycibus æqualibus hispids. *Hort.*
cliff. 385. * *Hort. ups.* 240. *
Achyrophorus fere glaber, bellidis glaucæ dentatoque
folio. *Vaill. act.* 1721. p. 278.
Hieracium ramosum, floribus amplis, calycibus valde
hirsutis, foliis oblongis obtusis: dentibus majoribus
inæqualibus incis. *Raj. suppl.* 144.
Habitat in Creta. ☉
- pontana.* 3. HYPOCHÆRIS foliis lanceolatis dentatis, caule
simplici folioso unifloro.
Hypochæris non ramosa, endiviæ folio prælongo, mo-
nanthos. *Vaill. act.* 1721. p. 215.
Hieracium latifolium pontanum præaltum glabrum, en-
diviæ folio. *Bucc. mus.* 2. p. 148. t. 113. *Raj. suppl.*
142.
Habitat in Sabaudia montibus.
- maculata.* 4. HYPOCHÆRIS caule subnudo: ramo solitario, fo-
liis ovato-oblongis integris dentatis. *Hort. cliff.* 385.
Fl. suec. 631. *Roy. lugdb.* 125. *Dalib. paris.* 239.
Hypochæris hirsuta, endiviæ folio, magno flore. *Vaill.*
act. 1721. p. 385. *Fl. lapp.* 288.
Hieracium alpinum latifolium hirsutis incanum, flore
magno. *Bauh. pin.* 128.
Hieracium latifolium 1. *Clus. hist.* 2. p. 139.
Hieracium alpinum, foliis dentatis, flore magno. *Bauh.*
pin. 128. *prodr.* 65. *Hall. helv.* 760. t. 24.
Habitat in Europæ frigidioris pratis asperis. ♀