

2495. **T. umbelláta** Bert., *rar. lig. pl. dec. I.* F. eretto, ramoso con rami divaricati (2-8 d.): fg. inf. lanceolate dentate, le sup. lineari, affatto intere: capolini mediocri, quasi in ombrella: ff. inv. esterne lesiniformi, più lunghe delle interne: pappo di 4 setole. ①. Luoghi erbosi della reg. mar. e camp. nella Penisola e nelle isole. Apr. Lug.

2496. **T. virgáta** Bert., *l. c. (1803)*. F. eretto, angoloso, ramoso (3-7 d.): fg. lanceolate dentate, le radicali bislungo-spatolate: capolini piccoli disposti in pannocchia: brattee cortissime: inv. a ff. esterne corte ed applicate: achenii tutti con pappo formato di 6-10 setole. ②. Luoghi erbosi c. s. Lug. Sett. T. altissima Pers.

2497. **T. grandiflóra** Ten., *viag., 128*. F. eretto, nudo in alto: fg. inf. lanceolate dentate, le sup. lineari affatto intere: capolini grandetti, in pannocchia, sopra peduncoli alternanti, con brattee setacee dalla metà in su, lasse, ricurve, quasi = all'inv.: pappo di 6-10 setole. ②. Nei campi in Lucania, ed in Calabria a Lagonegro e Balvano. Mag. Giu.

#### GEN. 407. — HYPOCHAÉRIS L.

(Da ὑπο, sotto, e χοιρος, porco).

2498. **Hypochaeris glábra** L., *sp. 811*. R. fusiforme, non ramosa: f. eretto, quasi nudo (1-4 d.): fg. quasi tutte radicali, in rosetta, lanceolato-spatolate, dentate o sinuate: capolini solitarii terminali a lunghi peduncoli: inv. cilindrico, a ff. glabre, le interne uguali alle corolle: achenii periferiali troncati, a pappo sessile. ①. Pascoli aridi della reg. mar. e camp. nella Penisola e nelle isole. Mar. Mag.

β. *arachnoídea* (Poir.): achenii senza rostro, con pappo lanato alla base. Nel Napoletano.

γ. *minima* Cyr.: acheni esteriori abortiti, gli altri tutti rostrati. H. Balbisii Lois, H. arachnoidea Biv.

2499. **H. radicáta** L., *sp. 811*. R. ramosa: f. eretti, ramosi o semplici in alto (3-8 d.): fg. tutte radicali, in rosetta, spatolato-lanceolate, sinuato-pennatofesse, a lobi ottusi: capolini grandi, campanulati, solitarii terminali: sq. inv. più corte delle corolle: achenii tutti con rostro più lungo di essi. 2. Comune nei luoghi erbosi, dal mare fino alle parti medie dei monti, nella Penisola e nelle isole. Mag. Ott.

β. *heterocárpa* Moris: achenii esteriori senza rostro. H. neapolitana et dimorpha Ten.

2500. **H. pinnatífida** Cyr. ex Ten. *syll., 406*. F. ascendenti, nudi (2-6 d.): fg. primordiali intere, le successive lanceolate bislunghe, sinuato-pennatifide o roncinate, a lacinie strette, le cauline lineari: capolini solitarii terminali: ff. inv. farinoso-pubescenti od irte di lunghi peli. 2. Pascoli alp. nel Piceno, nell'Abruzzo, in Aspromonte, in Sicilia ed in Corsica. Mag. Giu.

2501. **H. maculáta** L., *sp. 818*. F. nudo in alto, diviso in 2-3 peduncoli o semplice, ispido (3-6 d.): fg. tutte radicali, bislunghe, dentate, quasi sessili, spesso macchiate di sanguigno: capolini grandi, terminali, emisferici: sq. inv. lanceolato-lineari, peloso-scabre, ottusette: achenii

*muricato-striati*, tutti con lungo rostro. 2. *Pascoli dei monti, dalla base fino alle cime loro, nella Penisola. Lug. Ag. Volg. Porcellina macchiata.*

2502. **H. uniflora** Vill., *Dauph.* 37 (1779). F. semplice, eretto, grosso, cavo, *rigonfiato in alto*, con 2-3 fg. (2-3 d.): fg. pubescenti lanceolate bislunghe, intere o dentellate: capolino grande, solitario terminale *al f.*: ff. inv. ovali-acuminate nerastre, *frangiato-dentate* negli orli ed irte nel dorso. 2. *Pascoli alp. al M. Viso, al Cenisio, nelle Alpi Bresciane, in Tirolo, ecc. Lug. Ag. Achyrophorus helveticus Scop.*

β. *Facchiniána* (Ambrosi): sq. inv. intere nei margini. *Pascoli subalpini in Tirolo.*

2503. **H. aetnensis** B. et H., *gen. II*, 520. F. eretto, *ramoso* (2-4 d.): fg. tutte radicali in rosetta, bislunghe od obovate, intere o dentate, pubescenti: capolini grandetti, in corimbo lasso povero: peduncoli *ispidi*: fg. inv. lanceolate, quasi uniseriate, irte di lunghi peli patenti. ①. *Comunissima nei luoghi aridi della reg. mar. e camp. nella Penisola e nelle isole. Mag. Giu. Seriola L. Volg. Radicchiella triforcata.*

β. *depressa* (Viv.): f. depresso: p. setoloso-ispida. *In Sicilia, in Corsica ed in Sardegna.*

γ. *foliosa*: f. più robusto, foglioso, con fg. obovato-cuneate. *In Calabria.*

2504. **H. cretensis** B. et Ch. F. quasi nudo, poco ramoso, glabro: fg. radicali ronciniate, irte in ambo le pagine, le cauline poche, lineari, interissime: peduncoli un po' ingrossati nell'apice: ff. inv. *pubescenti-biancastre e setoloso-irsute*. ①, ②. *In Sicilia. Apr. Giu.*

2505. **H. laevigata**. F. *semplice o poco ramoso*, quasi nudo: fg. radicali lanceolato-spatolate od obovate, grossolanamente dentate, le cauline lineari brevissime: capolini mediocri, terminali: sq. inv. lanceolate, ispidi nella carena: *peduncoli nudi od appena ispidi nell'apice*. 2. *In Calabria ad Aspromonte e alla Sila, ed in Sicilia. Mar. Giu. Seriola L.*

β. *glauca* Tin.: fg. glabre: setole dell'inv. bianche. *In Sicilia.*

γ. *albida* Tin.: fg. ispidi: setole dell'inv. nere. *In Sicilia.*

#### GEN. 408. — ROBERTIA DC.

(Ded. a Robert, botanico corso).

2506. **Robertia taraxacoides** DC., *fl. fr. V*, 453. Fg. tutte radicali, allungate, lirato-pennatofesse, con lacinie strette, la terminale quasi triangolare: capolini mediocri, solitarii, sopra peduncoli radicali (1-2 d.). 2. *Pascoli elevati dei monti dell'Appennino e delle isole. Mag. Ag.*

#### GEN. 409. — THRINCIA Hoff.

(Da θρυκός, merli di un muro, pel lembo del calice negli achenii periferici).

2507. **Thrinicia hirta** Roth., *cat. I*, 98. Fibre radicali, *filiformi*: fg. tutte radicali, lanceolate, dentate o pennatofesse, ispidi per peli brevis-