

Familles.	Spèces.	Patrie des espèces déjà connues.
	<i>Empetrum rubrum</i> , Soland.	Détroit de Magellan.
LOBÉLIACÉES.	<i>Pratia repens</i> (1) (genre nouveau).	
CHICORACÉES.	<i>Hypochæris arenaria</i> (2) (nouv. espèce). <i>Taraxacum pumilum</i> (3), id.	
CYNAROCEPHALES.	<i>Nassauvia Gaudichaudii</i> (4), Cassini (nouvelle espèce).	
CORYMBIFÈRES.	<i>Cacalia candicans</i> , Willd.  <i>Gnaphalium consanguineum</i> (5) (nouv. espèce).  <i>Baccharis tridentata</i> , Persoon. <i>Conyza magellanica</i> , Willd. <i>Erigeron Vahlii</i> (6) (nouvelle espèce).	Détroit de Magellan.  <i>Id.</i>

(1) PRATIA. *Calyx* ovario adnatus, limbo libero, 5-dentato. *Corolla* sub-infundibuliformis dorso usque ad basim fissa, limbo 5-fido patente. *Stamina* 5 filamenta superne in tubum connata; antheræ connatae. *Stigma* bilobum. *Capsula* calyce carnoso oblecta, bilocularis, non dehiscens; loculis polyspermis.

Herbulæ pusillæ. Caules filiformes, ramosi, repentes. Folia sub-reniformia, crassiæcula, flores axillares, solitarii, pedunculati, pallide roseo-violacei, pedunculis subbracteolatis.

(2) *Hypochæris arenaria*. Caule ramoso, erecto, plurifloro, foliisque hispidulis, subsquamoso-pinnatifidis, radicalibus minus profunde incisis; involucro piloso.

(3) *Taraxacum pumilum*. Caule subramoso, foliisque piloso-lanatis, linearie lanceolatis, acutis.

(4) *Nassauvia Gaudichaudii*. Caulibus conferto-ramosissimis, foliis parvis, imbricatis, squarroso-recurvatis, rigidis, lanceolatis, margine spinoso-dentatis. (*Mastigophorus Gaudichaudii*, H. Cassini, Dict. Sc. Nat., tom. 34, p. 222).

(5) *Gnaphalium consanguineum*. Caulibus herbaceis simplicibus, erectis, foliis albo-lanatis, spathulatis, subacutis; spica terminali coarctata inferna subinterrupta, involucris sessilibus, flavescens-fuscis, glabris, nitentibus.

(6) *Erigeron Vahlii*. Caulibus herbaceis sub-simplicibus erectis, fo-