

Humillimum glabrum ramosum, 10-15 mill. l.; stipula angusta petiolo brevissimo longiora; foliola cuneata elevata nervata summo obsolete denticulata subemarginata; flores solitarii bractearum pare commitati, corolla pallide lutea; legumine sepalis ovatis mucronatum fere involutum.

Hab. —Maroc: Atlas Rifain, meseta de Isaguen, 1600 m.

Fezia elata Sennen nov. an *Cordylocarposezia Maireana* (*Cordylocarpus muricatus* × *Fezia pterocarpa* Sennen nov.

Elata ramosissima, breve pilositate reflexa tuberculata hispida vestita; folia fere omnia basin relegata pinnatipartita sublyrata, caulina inferiora ipsa simplicia sequentibus multum reductis acutilobatis; flores mediocres dense corymbosi pallide lutei, petalis oblongis venis reticulatis percursis; siliquæ pedicellatæ oblonge torulosæ, articulo superiore oblonga bilobata longerostrata, parte centrale parce muricate.

Hab. Maroc: Metalza, à Ain-Zora, 850 m.

Leg Sennen et Mauricio

Hypochæris atlantica Sennen et Mauricio, nov. gr. *radicata?*

Pluricaulis ramosa aspera subdenticulata valde dense striulata bracteolata; folia angusta oblonga runcinata multisecta longesetosa ciliata; periclinii exteris bracteis appressis lanceolatis valde ciliatis, interioribus late linearibus acutis stricte scariosis multum longioribus, paleis strictissime acuminatis pappo subrufescente æquilongis fere 3 cent.; ligulæ valde effusæ extus lividæ: achæni transverse striolati diversiter longe-rostrati cum paleis rufescentibus longe subulatis intercalatis.

Hab. —Maroc: Atlas Rifain, montagnes de Ketama, 1600 m.

Leg. Sennen et Mauricio

Linaria Atlantis-rifea Sennen et Mauricio, nov.

Ramosissima erecta glabra præter inflorescentia sepalaque breve laxe glandulosa; folia angusta lanceolata obtusa; corolla lilacina parvula, 4 mill. circiter l.; sepala linearia glandulosissima capsula glabra 2-plo curtiora; semina nigra breve alata disco dense papillosa.

Hab. —Maroc: Atlas Rifain, à Beni-Bufrah, 1300 m.

Leg. Sennen et Mauricio