

HYPOCHÆRIS MACULATA. Lin.—Lois.,
Fl. Gall. 531.

Cette plante varie beaucoup : on la trouve le plus souvent à feuilles marquées de taches violettes, et quelquefois à feuilles dépourvues de taches; on la rencontre uniflore, d'autres fois sa tige se ramifie et porte jusqu'à cinq à six fleurs; enfin, ses feuilles sont simplement dentées ou elles sont pinnatifides. M. Perret m'a communiqué cette dernière variété, qu'il a recueillie aux environs de Turin.

HYPOCHÆRIS BALBISII. N.

H. foliis obovato-oblongis dentatis hispidis, scapis subunifloris, calycibus glabriusculis, pappis omnibus stipitatis æqualibus. H. minima. Balb. Misc., Alt. 29 (non Desf. nec Willd.).

Cette espèce m'a été communiquée par M. Balbis qui l'a trouvée dans les lieux stériles, aux environs de Frejus, en Provence. Elle diffère évidemment de l'*H. minima* par ses aigrettes toutes pédiculées; quant à cette dernière plante, je crois qu'elle n'est qu'une variété de l'*H. glabra*. (○).

SERRATULA TINCTORIA. Lin. — Lois.,
Fl. Gall. 534.

β. *S. integrifolia, foliis indivisis serratis.*