

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 811

5. HYPOCHÆRIS glabra, calycibus oblongis imbricatis, caulo nudo, foliis dentato-sinuatis. *Hort. cliff.* 386. *n. 4. Hort. upf.* 240. * *Roy. lugdb.* 126. *Dalib. paris.* 239. *Sauv. monsp.* 300.
Hypochæris chondrillæ folio, parvo flore. Vaill. a. 1721. p. 214.
Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo glabro. Benth. pin. 127.
Hyoseris altera. Tabern. hist. 490.
Habitat in Dania, Germania, Belgio. ☽
6. HYPOCHÆRIS foliis dentato-sinuatis scabris, caule radicata, ramoso nudo, pedunculis squamosis. *Hort. cliff.* 386. *Roy. lugdb.* 125. *Dalib. paris.* 239. *It. scan.* 225. * *Sauv. monsp.* 299.
Hieracium, dentis leonis folio obtuso, majus. Benth. pin. 127. Moris. hist. 3. p. 66. f. 7. t. 4. f. 27.
Hieracium longius radicatum. Lob. hist. 120. Raj. hist. 230.
Hieracium tertium. Dod. pempt. 639.
Habitat in Europæ cultioris pascuis.

LAPSANA.

1. LAPSANA calycibus fructus angulatis, pedunculis *communis.* tenuibus ramotissimis. *Hort. cliff.* 384. *Fl. succ.* 649. *Roy. lugdb.* 130. *Hort. upf.* 246. *Dalib. paris.* 244. *Gmel. fib. 2. p. 40.*
Lapsana. Dod. pempt. 675.
Soncho affinis Lapsana domesticæ. Benth. pin. 124.
Habitat in Europæ cultis.
2. LAPSANA calycibus fructus torulosis depresso ob-tusis sessilibus. *Zacintha.* Lapsana calycibus fructus subrotundis angulatis, pedunculis incrassatis, floribus erectis. *Roy. lugdb.* 131. *Hort. cliff.* 390.
Chondrilla verrucaria. foliis cichorei viridibus. Benth. pin. 130.
Cichorium verrucatum, zacintha. Cluf. hist. 2; p. 144.
Habitat in Italia. ☽
Toruli calycis fructiferi oculo, gibbi, profunde distincti nodis rufescensibus, exteriora vere calycis foliola temera & mollia persistunt.
3. LAPSANA calycibus fructus unique patentibus *rastellata.* diis subularis, foliis lanceolatis indivisis. *Hort. upf.* 245. * *Sauv. monsp.* 8. *Hie-*