

Subtrib. IV. HYPOCHÆRIDEÆ Less. syn. 130. *Don in linnæa* 1831. litt. p. 139. *Schultz ann. sc. nat.* 1835. p. 301. — Lactuceæ Scorzonereæ Hypochærideæ *Cass. opusc. 3. p. 46.*

Recept. paleaceum. Pappus paleolatus, paleolis angustissimè semilanceolatis saltem interioribus et in achæniis interioribus pinnatisectis. — Herbæ floribus flavis.

DCCXCII. HYPOCHÆRIS. — Hypochæridis sp. *Vaill. act. acad. par.* 1721. *Linn. gen. n.* 918. *Lam. ill. t. 656. DC. fl. fr. 4. p. 46.* — Hypochæridis et Achyrophori sp. *Gærtn. Less.*

Capitulum multiflorum. Invol. ovato-oblongum aut subcampanulatum, squamis imbricatis. Recept. paleis inter flores onustum. Achænia glabra muriculata, nunc omnia suberostria, nunc omnia rostrata. Pappus biserialis, setis exter. subfiliformibus brevioribus, inter. longioribus plumosis. — Herbæ annuæ aut biennes, glabræ aut pilosæ, Gerontogeæ, acaules aut simplicicaules aut ramosæ. Folia nunc radicalia nunc acaulia, integra dentata aut pinnatilobata. Flores lutei.

Sect. I. ARACHNITES.

Achænia omnia suberostria. Pappus biserialis. — Species annua.

1. H. ARACHNOIDEA (Poir. dict. 5. p. 572), foliis radicalibus aut ex caulis parte inferiore ortis oblongis basi attenuatis dentatis glabris subciliatis, scapo ramoso, invol. squamis dorso sparsè hirtellis aut glabris, achæniis omnibus erostribus, pappo biseriali, setis interioribus lanâ copiosâ plumosis. (I) in Mauritaniâ (Poir.), in arvis arenosis maritimis regni Neapolitani (Ten.). Fortè diversa ab H. arachnoideâ Desf. fl. atl. emend. et Bivon. cent. 2. p. 31. de quâ cl. auctores dixerunt achænia centralia rostrata, et quæ fortè ad H. glabra pertinet. Hinc fortè pertinet H. hispida Brot. fl. lus. 1. p. 332. sed ferè glabra sunt specim. nostra equidem culta. (v. v. c.)

Sect. II. EUHYPOCHÆRIS *Duby bot. gall.* 1. p. 306. — Hypochæris *Gærtn. fr.* 2. p. 374. *t. 160. f. 4. Less. syn.* 130. — Achyrophorus *Tausch in florâ* 1829. *erg. p. 37. non Scop.*

Achænia radii suberostria, disci rostrata.

2. H. GLABRA (Linn. sp. 1141), foliis radicalibus lanceolato-oblongis runcinatis aut sinuato-dentatis glabris aut hirtis, scapis glabris nudis ramosis simplicibusve, invol. glabris, achæniis radii suberostribus, pappo biseriali. (I) in Europæ arvis pascuis collibus. Fl. dan. t. 424. Lam. ill. t. 646. f. 1. Curt. lond. t. 149. Schkuhr handb. t. 225. Hypoch. stellata Gat. fl. mont. 140. H. dimorpha Brot. fl. lus. 1. p. 332. H. adscendens Brot. phyt. lus. t. 25. Herba vulgaris valde varians.

3. *simplex* (DC. fl. fr. 5. p. 452), scapis simplicibus, foliis glabris dentatis aut subintegris. — H. simplex Merat. fl. par. ed. 1. p. 310. (v. s.)

γ. *minima*, scapis simplicibus, foliis hirtis subruncinatis aut grossè sinuatis, — H. minima Cyr. pl. rar. neap. fasc. 1. p. 10. Desf. fl. atl. 2. p. 238? H. pusilla Poir. suppl. 4. p. 530. (v. s.)

δ. *Thracica*, scapis ramosis, foliis lingulatis setis sparsis rigidulis subscabris. — in Thraciâ ad Lampsacum. H. Thracica Stev. in litt. 1833. (v. s.)

ε. *hirsuta*, scapis ramosis, foliis obtusè sinuato-pinnatifidis setis consertis hirsuto-scabris. — in Siciliâ legit cl. Gussone. H. hispida Brot. fl. lus. 1. p. 332? (v. s.)

ζ. *P Capensis*, scapis ramosis, foliis linearis-oblongis glabris sinuato-pinnati-