

Subtrib. IV. *HYPOCHÆRIDEÆ* Less. syn. 130. Don in *linnaea* 1831. litt. p. 139. Schultz ann. sc. nat. 1835. p. 301. — Lactuceæ Scorzonereæ Hypochærideæ Cass. opusc. 3. p. 46.

Recept. paleaceum. Pappus paleolatus, paleolis angustissimè semilanceolatis saltem interioribus et in achæniis interioribus pinnatisectis. — Herbæ floribus flavis.

DCCXCII. *HYPOCHÆRIS*. — Hypochæridis sp. Vaill. act. acad. par. 1721. Linn. gen. n. 918. Lam. ill. t. 656. DC. fl. fr. 4. p. 46. — Hypochæridis et Achyrophori sp. Gærtn. Less.

Capitulum multiflorum. Invol. ovato-oblongum aut subcampanulatum, squamis imbricatis. Recept. paleis inter flores onustum. Achænia glabra muriculata, nunc omnia suberostria, nunc omnia rostrata. Pappus biserialis, setis exter. subfiliformibus brevioribus, inter. longioribus plumosis. — Herbæ annuæ aut biennes, glabræ aut pilosæ, Geron-togæ, acaules aut simplicicaules aut ramosæ. Folia nunc radicalia nunc acaulia, integra dentata aut pinnatilobata. Flores lutei.

Sect. I. ARACHNITES.

Achænia omnia suberostria. Pappus biserialis. — Species annua.

1. *H. ARACHNOIDEA* (Poir. dict. 5. p. 572), foliis radicalibus aut ex caulis parte inferiore ortis oblongis basi attenuatis dentatis glabris subciliatis, scapo ramoso, invol. squamis dorso sparse hirtellis aut glabris, achæniis omnibus eros-tribus, pappo biseriali, setis interioribus lanâ copiosâ plumosis. (I) in Mauri-taniâ (Poir.), in arvis arenosis maritimis regni Neapolitani (Ten.). Fortè di-versa ab *H. arachnoideâ* Desf. fl. atl. emend. et Bivon. cent. 2. p. 31. de quâ cl. auctores dixerunt achænia centralia rostrata, et quæ fortè ad *H. glabram* pertinet. Huc fortè pertinet *H. hispida* Brot. fl. lus. 1. p. 332. sed ferè glabra sunt specim. nostra equidem culta. (v. v. c.)

Sect. II. *EUHYPOCHÆRIS* Duby bot. gall. 1. p. 306. — Hypochæris Gærtn. fr. 2. p. 374. t. 160. f. 4. Less. syn. 130. — Achyrophorus Tausch in florâ 1829. erg. p. 37. non Scop.

Achænia radii suberostria, disci rostrata.

2. *H. GLABRA* (Linn. sp. 1141), foliis radicalibus lanceolato-oblongis runcinatis aut sinuato-dentatis glabris aut hirtis, scapis glabris nudis ramosis simplici-busve, invol. glabris, achæniis radii suberostrius, pappo biseriali. (I) in Eu-ropæ arvis pascuis collibus. Fl. dan. t. 424. Lam. ill. t. 646. f. 1. Curt. lond. t. 149. Schkukr handb. t. 225. Hypoch. stellata Gat. fl. mont. 140. *H. dimor-pha* Brot. fl. lus. 1. p. 332. *H. adscendens* Brot. phyt. lus. t. 25. Herba vul-garis valdè varians.

β. *simplex* (DC. fl. fr. 5. p. 452), scapis simplicibus, foliis glabris dentatis aut subintegris. — *H. simplex* Merat. fl. par. ed. 1. p. 310. (v. s.)

γ. *minima*, scapis simplicibus, foliis hirtis subruncinatis aut grossè sinuatis, — *H. minima* Cyr. pl. rar. neap. fasc. 1. p. 10. Desf. fl. atl. 2. p. 238? *H. pusilla* Poir. suppl. 4. p. 530. (v. s.)

δ. *Thracica*, scapis ramosis, foliis lingulatis setis sparsis rigidulis subscabris. — in Thraciâ ad Lampsacum. *H. Thracica* Stev. in litt. 1833. (v. s.)

ε. *hirsuta*, scapis ramosis, foliis obtusè sinuato-pinnatifidis setis confertis hir-suto-scabris. — in Sici-liâ legit cl. Gussone. *H. hispida* Brot. fl. lus. 1. p. 332? (v. s.)

ζ. *Capensis*, scapis ramosis, foliis lineari-oblongis glabris sinuato-pinnati-