

- †† *Foliis runcinatis, pinnatifidis: appendice seminum basilari. Podosperma Cand.*
- laciniata* 28. Sc. caule ramoso scabriusculo, foliis inferioribus pinnatifidis linearibus, superioribus indivisis, anthodii glabri flosculos subaequantis squamis sub apice mucronatis. *Europa.* (Sc. muricata Balb. var. caule aspero.)
- calcitrapifolia* 29. Sc. caule pubescente, foliis lyrato-pinnatifidis, anthodii flosculis minoris squamis sub apice mucronatis. *Gallia austr. Neapol. Sicil. Graecia. Ad Volgam. Afric. bor.* (Sc. refledaefolia Retz., Tenorii Presl.)
- octangularis* W. 30. Sc. caule glabriusculo ramoso, foliis pinnatifidis, inferioribus lanceolatis, superioribus linearibus, anthodii flosculos aequantis ante anthesin octogoni squamis sub apice mucronatis. *Trans-sylvan. Sicilia.*
- taraxacifolia* 31. Sc. scapo dichotome ramoso, foliis radicalibus lyrato-runcinatis pilosiusculis. *Bohemia.*
- coronopifolia* 32. Sc. scapo tomentoso 1floro, foliis pinnatifidis dentatis obtusis pubescentibus. *Numidia.* (Sc. brevicaulis Vahl.)
- pumila* Cav. 33. Sc. scapo squamoso 1floro glabro, foliis pinnatifidis glabris, laciniis linearibus calloso-mucronatis. *Hispania.*
- ** *Desciscentes pappo setaceo scabro.*
- tomentosa* 34. Sc. caule simplici foliato, foliis sessilibus ovatis integerrimis nervosis tomentosis, pedunculis axillaribus 1floris. *Armenia.*
- villosa* Scop. 35. Sc. caule ramoso foliisque linearibus carinatis villosis, ramis 1floris. *Ager tergest.*
- hirsuta* 36. Sc. caule simplici 1floro foliisque linearibus hirsutis, pappo rufo s. fulvo. *Gallia austr. Italia.* (Tragopogon hirsutum Gouan. Garidel. Cand., calyculatum Jacqu., monente Reichenb.)
- elongata* W. 37. Sc. caule subramoso folioso, foliis subtus tomentosis, radicalibus lyratis, caulinis pinnatis. *Ins. maris aegei.* (Catananche graeca L.)

2897. HELMINTHIA Juss.

- echioides* W. *Anglia. Gallia. Italia.* Herba ramosa hispido-aculeata, foliis amplexicaulibus oblongis, anthodio apice pinnatifido-spinuloso, floribus flavis. (Picris echioides L., Helm. spinosa Cand. var.)

2898. HYPOCHOERIS.

- canescens* Stev. 1. H. caule ramoso folioso, foliis oblongis sinuato-dentatis, pedunculis subsquamosis anthodioque incano-pubescentibus. *Caucas.*
- radicata* 2. H. caule ramoso nudiusculo laevi, foliis runcinatis obtusis hirsutiusculis, pedunculis squamosis. *Europ.* (Achyrophorus Scop.)

- glabra* 3. H. caule subramoso nudiusculo, foliis oblongis (obtusis sinuato-dentatis anthodiisque glabris, pedunculis esquamatis. *Europ.*
- macrorrhiza* 4. H. caule subfoliato simpliciusculo glabro, foliis radicalibus lanceolatis acutis paucidentatis hispidiusculis, caulinis lineari-filiformibus, anthodio glabro. *Calabria.*
Günth.
- dimorpha* Brot. 5. H. caule ramoso nudiusculo glabro, foliis radicalibus oblongis obtusis sinuato-dentatis sparsè pilosis, pedunculis subsquamatis, anthodio glabro flosculos subaequante, pappo radii piloso. *Lusitania.*
- arachnites* 6. H. caule subramoso nudiusculo glabro, foliis radicalibus oblongis obtusis sinuato-dentatis hispidis, anthodio setoso glabroque, pappo radii arachnoideo-lanato. *Sicil. Hispan. Afric. bor.* (H. minima Desf., hispida Roth. Achyrophorus minimus Hornem. H. ascendens Brot. var. anthodio glabro.)
Bivon.
- hispida* W. 7. H. caule ramoso, foliis lanceolatis dentatis, anthodio hirto. *Patria?*
- maculata* 8. H. caule stricto nudiusculo sub-1floro foliisque radicalibus oblongis dentatis villosis, pedunculis incrassatis. *Europ. Caucas.* (Achyrophorus Scop.)
- helvetica* 9. H. caule simplicissimo 1floro foliato, foliis radicalibus lanceolatis denticulatis hirsutis, caulinis ciliatis, pedunculo incrassato, squamis anthodii ovatis. *Alp. Europ. med.* (H. 1flora Vill.)
- jonchoides* 10. H. caule simplicissimo 1floro subfoliato abbreviato, foliis radicalibus oblongo-lanceolatis dentatis glabris, anthodii laevis squamis oblongis. *Alp. Quit.* Pappus sessilis.
Kunth.

2899. KRIGIA Schreb.

- virginica* W. 1. Kr. scapo simplici glabro basi foliato 1floro erecto, foliis lanceolatis integerrimis subruncinatisque glabris glaucescentibus. *Virginia.* (Hyoseris virginica L., montana Mx.)
- caroliniana* 2. Kr. scapo elongato anthodioque glanduloso-piloso, foliis omnibus runcinatis glabriusculis glaucis. *Carolina.* (Hyoseris caroliniana Walt.)
Nutt.
- dichotoma* Nutt. 3. Kr. caule tenero dichotomo glanduloso-pubescente, foliis spathulato-linearibus subintegerrimis ciliatis, pedunculis elongatis 1floris. *Amer. bor.* (Kr. tenella Reichenb., oppositifolia Rafin.? Hyoseris ramosissima Bart.)
- amplexicaulis* 4. Kr. caule erecto nudiusculo sub-3fido foliisque glabris glaucis, radicalibus spathulatis sublyratis caulinis amplexicaulibus lanceolatis integerrimis. *Amer. bor.* (Tragopogon virginicum L., Hyoseris 2flora Walt., prenanthoides W., amplexicaulis Mx., Troximon virginicum Pers.)
Nutt.
- Dandelion* 5. Kr. radice tuberosa, scapo 1floro, foliis lineari-lanceolatis remote serratis glaucis laevibus. *Vir-*
Nutt.