

810 SYNGENESIA: POLYGAMIA AEQUALIS.

cretica.

8. HYOSERIS fructibus ovatis scabris, caule ramoso.
Lapsana fructibus ovatis scabris, seminibus disci calycu-
 lato-papposis. *Hort. upf.* 246. *

Habitat in Creta.

HYPPOCHÆRIS.

wens.

1. HYPOCHÆRIS foliis dentatis, caule ramoso folio-
 so, calycibus hispidis. †
Hypochæris hieracii barbati folio, calyce hispido. *Vaill.*
act. 1721. p. 215.
Hieracium alpinum, dentis leonis folio acuto piloso pro-
 scisso, capitulis pungenti lanugine obsitis. *Cup. cath.*
 95. *Raj. suppl. 146.*
Habitat in Sicilia.
Calycis squamæ asperæ spinulis pungentibus.

Achyrophor.

2. HYPOCHÆRIS calycibus æqualibus hispidis. *Hort.*
*cliff. 385. * Hort. upf. 240. **
Achyrophorus fere glaber, bellidis glauco dentatoque
 folio. *Vaill. act. 1721. p. 278.*
Hieracium ramosum, floribus amplis, calycibus valde
 hirsutis, foliis oblongis obtusis: dentibus majoribus
 inæqualibus incisis. *Raj. suppl. 144.*
Habitat in Creta. ☽

pontana.

3. HYPOCHÆRIS foliis lanceolatis dentatis, caule
 simplici folioso unifloro.
Hypochæris non ramosa, endiviæ folio prælongo, mo-
 nanthos. *Vaill. act. 1721. p. 215.*
Hieracium latifolium pontanum præaltum glabrum, en-
 diviæ folio. *Bocc. mus. 2. p. 148. t. 113. Raj. suppl.*
 142.
Habitat in Sabaudiæ montibus.

maculata.

4. HYPOCHÆRIS caule subnudo: ramo solitario, fo-
 liis ovato-oblongis integris dentatis. *Hort. cliff. 385.*
Fl. suec. 631. Roy. lugdb. 125. Dalib. paris. 239.
Hypochæris hirsuta, endiviæ folio, magno flore. *Vaill.*
act. 1721. p. 385. Fl. lapp. 288.
Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum, flore
 magno. *Bauh. pin. 128.*
Hieracium latifolium 1. Clus. bist. 2. p. 139.
Hieracitum alpinum, foliis dentatis, flore magno. *Bauh.*
 pin. 128. prodr. 65. *Hall. helv. 760. t. 24.*
Habitat in Europæ frigidioris pratis asperis. 2