

SALTA. Dep. Santa Victoria: Abra de Lizoite, R. Kiesling 209 (LP). Dep. Poma: Abra Muñaño, A. L. Cabrera 8982 (LP).

4b. *Hypochoeris meyeniana* var. *ciliata* (Wedd.) Perkins, *Bot. Jahrb.* 49: 232, 1913. — *Achyrophorus meyenianus* var. *ciliatus* Weddell, *Chloris Andina*, 1: 220, 1857.

Se diferencia de la var. *meyeniana* por las hojas y la parte superior de las filarias hirsutas.

Vegeta con la variedad anterior, pero es más escasa.

Exsiccata. Dep. Humahuaca: Mina Aguilar, T. Meyer et al. 21.306 (LIL, LP), J. Fernández 2029 (LP). Dep. Valle Grande, A. Burkart et N. S. Troncoso 11.627 (SI, LP).

Obs. Esta variedad puede confundirse con *H. eremophila* Cabr. de la que difiere por los capítulos completamente sésiles y algo menores.

4c. *Hypochoeris meyeniana* var. *eriolaenoides* Cabrera, *Rev. Invest. Agric.* 11: 410, 1958.

Se diferencia de la var. *meyeniana* por las filarias laxamente tomentosas en el dorso.

Hallada sólo en la Sierra de Zenta, a 4500 m s.m.

Exsiccata. JUJUY. Sierra de Zenta, Budin, II-1931 (Typus varietatis: LP).

4d. *Hypochoeris meyeniana* var. *brachylepis* nov. var. ⁽¹⁾

Se diferencia de las variedades anteriores por las hojas de 40-130 mm de largo por 10-40 mm de ancho y los capítulos muy grandes, con involucro de 12-15 mm de altura por 20-25 mm de diámetro, con filarias exteriores anchamente ovadas, de 5-7 mm de anchura.

Vegeta con la var. *meyeniana*.

Exsiccata. JUJUY. Dep. Yavi: alrededores de La Quiaca, T. Meyer et al. 21.270 (Typus varietatis: LP); Abra de Lizoite, H. A. Fabris et F. O. Zuloaga 7767 (LP). Dpto. Rinconada: Mina Pirquitas, H. A. Fabris et F. O. Zuloaga 7701 (LP). Dpto. Humahuaca: Azul Pampa, A. L. Cabrera et al. 15.204 (LP); Cerro Aguilar, J. Hunziker et O. Caso 6217 (BAB, LP); entre Mina Aguilar y Tres Cruces, T. Meyer et al. 21.107 (LIL, LP); Tres Cruces, R. Kiesling 328 (LP). Depto. Tilcara: cerro al E de Huacalera, D. Werner 368 (LP).

5. *Hypochoeris radicata* Linnaeus, *Spec. Plant.* 2: 811, 1753.

Hierba perenne, con hojas dispuestas en roseta y tallos escapiformes, simples o poco ramificados, estriados, glabros, con brácteas en las bifurcaciones, de 10-50 cm de altura. Hojas oblanceoladas u oblongas, obtusas, más o menos profundamente runcinadas, hirsutas en ambas caras, de 40-160 mm de longitud por 12-40 mm de anchura. Capítulos solitarios en los extremos de las ramificaciones del escapo. Involucro acampanado, de 10 mm de altura durante la floración, luego acrescente, alcanzando cerca de 20 mm;

⁽¹⁾ *Hypochoeris meyeniana* var. *brachylepis* Cabrera nov. var. A varietate meyeniana differt capitulis majusculis involucro 12-15 mm alto, 20-25 mm crasso, filariis externis late ovatis, 5-7 mm latis. Typus varietatis: Jujuy: Dep. Yavi, alrededores de La Quiaca, T. Meyer et al. 21270 (LP).