



X.

HYP O C H Æ R I S M I N I M A .

HYPOCHÆRIS foliis sinuato-lyratis , caule superius minima .
 appendicibus squamosis , instructo .

D E S C R I P T I O .

Radix perpendicularis 2-vel 3-pollicaris , annua ,
 fibrosa .

Folia omnia radicalia decumbentia , sinuato-lyrata ,
 leviter scabra .

Caulis nudus , simplex & uniflorus , deinde ramo-
 sus , in duos vel tres ramulos unifloros divisus . Ver-
 sus summitatem caulium vel ramorum appendices adsunt
 parvæ , lineares , adpressæ , *bractæas* mentientes , lateri-
 bus sphacelatis .

Caules palmares , læves .


Flos parvus , luteus , æqualis . *Calyx* fere calycula-
 tus , laciniis inæqualibus , acutis , apice sphacelatis . Ba-
 sis calyculo parvo cincta . *Flores* aperiuntur hora ma-
 rutina 11. clauduntur vespertina secunda . *Semina* in
 ambitu pappo sessili , simplici ; in disco pappo longius
 stipitato coronata .

Receptaculum paleaceum , paleis minutis .

Habitat in locis siccis Vulcanicis , & præsertim in
loco dicto la Solfatarà . Floret a Majo ad Julium .

Obs. Infecta concretiones ex natura gallarum , cir-
 ca caules efformant , unde caules sæpe monstrosi , præ-
 fertim in aridis .

Tab. 10.



Agriellus d.

Hypochaeris minima

De Cramer et