

fidis. — ad Cap. Bonæ-Spei. H. glabra E. Mey. in Drege coll. H. Capensis Less. syn. 130. Hyoseris tenella Thuub. fl. cap. 613. Capitula paulò quàm priorum minora. (v. s.)

3. H. NEAPOLITANA, radice fasciculatâ, collo pluricipiti, foliis radicalibus oblongis obtusis basi attenuatis sinuato-dentatis, junioribus scabridis, demùm glabratis ciliatis, scapo ramoso involucrisque glabris, achæniis radii breviter, disci longè rostratis, pappo biseriali. \mathcal{L} in sylvis arenosis maritimis regni Neapolitani, H. dimorpha Ten. syn. 407. Guss. in litt. 1831 non Brot. Radix constat fibris plurimis crassis è collo ortis. (v. s.)
4. H. SALZMANNIANA, radice exili subsimplici, foliis radicalibus obovato-oblongis obtusis basi attenuatis sinuato-dentatis setulis rigidis ciliatis, caulinis paucis, caule subnudo parçè ramoso setulis parçis brevibus exasperato, pedunculis sub involuero subincrassato, invol. squamis acuminatis, exterioribus dorso setoso-asperis, achæniis radii erostribus, disci rostratis, pappo biseriali. ① in agro Tingitano detexit cl. Salzmann. H. dimorpha Salzmann. pl. exs. (v. s.)

Sect. III. PORCELLITES. — Porcellitis sp. Cass. — Achyrophorus Gærtn. fr. 2. p. 37. t. 150. Less. syn. 130. non Scop. — Hypochæris Tausch in florâ 1829. erg. p. 37. non Gærtn.

Achænia omnia æqualiter rostrata.

5. H. BALBISII (Lois. not. 124. DC. fl. fr. suppl. p. 452), foliis omnibus radicalibus runcinatis obtusis glabris aut ciliatis, scapis sub capitulis subincrassatis ramosis polycephalis aut simplicibus 1-cephalis, invol. glabris, squamis exter. obtusis, achæniis omnibus æqualiter et longè rostratis, pappo biseriali. ① ② in arvis Bohemiæ (Jacq.), Galliæ circâ Nannetes, Lugdunum, Galloprovinciæ, Vasconiæ (Dufour!), Hispaniæ (Lag!). Scorzonera taraxacifolia Jacq. ic. rar. t. 160. coll. 1. p. 52. Hyp. intermedia Richt. fl. lips. et in Fer. bull. 1830. p. 424. H. uniflora β . Poir. suppl. 4. p. 530. Achyrophorus Balbisii Horn. h. hafu. suppl. 91. Hyp. minima Balb. misc. 1. p. 29. non Cyr. Fortè ex Cass. varietas H. glabræ sed achænia exteriora rostrata nec erostrata. (v. s.)
6. H. RADICATA (Linn. sp. 1140), foliis radicalibus runcinatis obtusis hispidis, scapis nudis glabris ramosis subdichotomis apice parçè squamellosis, invol. glabri aut scabridi squamis etiã exterioribus acuminatis, pappo biseriali. ② ex Reich. in agris pascuis et sylvis Europæ. Sow. engl. bot. t. 831. Curt. lond. t. 168. Fl. dan. t. 150. Achyrophorus radicans Scop. carn. ed. 2. n. 981. Gærtn. fr. 2. t. 159. Porcellites radicata Cass. dict. 43. p. 43. Seriola taraxacifolia Salzmann in florâ 1821. p. 111? — Lob. ic. t. 238. f. 1. (v. v.)

† *Species exclusæ.*

- H. APARGIOIDES Hook. et Arn. = Achyrophorus apargioides.
 H. ARENARIA Gaudich. = Achyrophorus arenarius.
 H. AURANTIACA Turcz. = Achyrophorus aurantiacus.
 H. BERTERII Colla. = Achyrophorus apargioides.
 H. CANESCENS Stev. = Picris lævis.
 H. CHRYSANTHA Poepp. = Achyrophorus chrysanthus.
 H. CORSICA Tausch. = Achyrophorus pinnatifidus.
 H. FOLIOSA Vill. = Achyrophorus Helveticus.
 H. GLAUCA Presl. = Seriola lævigata β .
 H. GRANDIFLORA Ledeb. = Achyrophorus aurantiacus.
 H. HELVETICA Linn. = Achyrophorus Helveticus.
 H. HISPIDA Willd. = Achyrophorus hispidus.
 H. MACRORHIZA Spreng. = Achyrophorus pinnatifidus.
 H. MACULATA Lind. = Achyrophorus maculatus.