

nervo medio pilis longis subrigidis, crispis, grossis praedita. Capitula campanulato-cylindrica.

Fortasse Beauverd recte dicit eam varietatem novam esse, sed specimen integrum non est et alia, quae comparentur, praesta non sunt.

**Hypochoeris ornata** Koster, nov. spec. — *Hypochoeris taraxacoides* var. *lanuginosa* Beauverd in Herzog, Pfl. boliv. And., 1923, 228 (nomen nudum) (fig. 3, a—b).

Herbacea, parva, acaulis, perennis,  $2\frac{1}{2}$  cm longa, 6 cm lata; radice crassa. Folia omnia radicalia, rosulata, sessilia, anguste oblonga, runcinato-pinnatifida, dentibus integris vel undulatis, saepe curvatis, subacute, crassa, apice subacute, parte basali pedunculiformi, margine basi lanata, pilis longis, cetera glabra,  $2\frac{1}{2}$ —3 cm longa, 5—7 mm lata. Capitulum solitarium, sessile, multiflorum, 2 cm longum, circa 13 mm crassum; involucro campanulato-cylindrico, squamis 3-seriatis, subaequilongis, lanceolatis, apice nigro-viridibus, acutis,  $1\frac{1}{2}$  cm longis,  $1\frac{1}{2}$ —2 mm latis, externis parte superiore pilis applatas, crispis, circa  $1\frac{1}{2}$  mm longis, interdum fissis praeditis. Flores bisexuales, corolla ligulata, apice 5-dentata, 14 mm longa, ligula 2 mm lata. Antherae apice obtuse, ad basin breviter sagittatae, partibus 2 obtusis. Styli rami breves, apice obtusi. Achenium immaturum, breve, cylindricum, erostatum, costatum, subangulatum; pappus uni-seriatus, setis plumosis, albis, 6 mm longis. Receptaculi squamae lanceolatae, apice subulatae.

Bevelander del.

Fig. 3 — *Hypochoeris ornata* Koster, nov. spec. a: planta florescens ( $\times 1$ ); b: squama involuci externa ( $\times 3$ ) — *Hypochoeris parvifolia* Koster, nov. spec. c: planta florescens ( $\times 1\frac{1}{4}$ ).

Hab.: am Cerro de Oruro auf steinigem trockenem Boden, 3800 m alt., Nov. 1911, n. 2522 c.

Obs.: *H. barbata* (Sch.-Bip.) Reiche differt folii margine ciliata et capitulo longiuscule pedunculato. *H. ornata* differt a ceteris speciebus affinibus et fortasse etiam a *H. barbata* (quam non vidi) pilis applanatis crispis involuci squamorum extenorium, quae causa nominis est.

