

Dep. San Rafael, Los Molles, arriba de El Cuchillo, leg. H. Sleumer, 676 (LP.).
 Dep. San Rafael, cerca del Valle del Río Grande, Minacor, leg. G. Covas, 3412 (LP.). Dep. Malalhue, Alto Valle del Atuel, leg. A. Ruiz Leal et F. Roig, 15701 (LP.); Valle del Atuel, cerca del Campamento Atuel, leg. T. W. Böchers, J. P. Hjerting et K. Rahn, 1505 (LP.).

HYPOCHOERIS (ACHYROPHORUS) PARODII nov. sp.

Fig. 7

Herba perennis, erecta, 50-80 cm alta; caulibus teretibus, costatis, glabris vel sparse hirsutis, superne ramosis, laxe foliosis. Folia basalia rosulata, oblanceolata, apice acuta, basi attenuata subpetiolata, margine sinuata, irregulariter dentata, vel lobata, 6-16 cm longa, 1-2 cm lata, utrinque glabra vel supra venis laxe hirsuta. Folia caulina pauca, distantia, lanceolata, apice attenuata acuta, basi dilatata subamplexicaulia, inferne magis minusve dentata, 6-10 cm longa, 1-2 cm lata. Folia suprema linearia bracteiformia. Capitula pauca (2-7) apicibus ramulorum solitaria, laxe cymoso-corymbosa. Involucrum campanulatum, ad anthesim 10-12 mm longum, ca. 10 mm crassum, postea leviter acrecente; bracteis involucralibus multiseriatis, linearibus, obtusis, dorso magis minusve dense hirsutis (pilis fulvis 1,5-2 mm longis), margine leviter tomentosus; bracteis externis ca. 5 mm longis, 0,6 mm latis; mediis 8-10 mm longis, 1 mm latis; internis usque 13 mm longis, 1 mm latis. Paleae receptaculi lineari-lanceolatae, hyalinae, apice bidentatae et in cirrho desinentes. Flores multi, lutei, longe exserti: tubulo ca. 4 mm longo, ligula 9 mm longa, 1,5 mm lata, apice pentadentata. Achaenia fusiformia, rostrata, pentasulcata: parte seminifera 5-7 mm longa, rostro tenue 3-4 mm longo. Pappus albus, uniseriatus, 5,5 mm longus.

Hierba perenne, erecta, de 50-80 cm de altura. Tallos redondeados, costados, glabros o con algunos pelos tiesos dispersos, ramificados, laxamente hojosos. Hojas basales arrosetadas, oblanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base en pseudopecíolo envainador más o menos largo, sinuadas, irregularmente dentadas o lobadas en el margen, de 6-16 cm de longitud, por 1-2 cm de anchura, glabras en ambas caras o con algunas cerdas rígidas sobre las nervaduras. Hojas caulinares pocas, situadas en las bifurcaciones del tallo, muy distantes, lanceoladas, atenuadas y agudas en el ápice, ensanchadas y semiamplexicaules en la base, más o menos profundamente dentadas en la parte inferior del margen, de 6-10 cm de largo, por 1-2 cm de ancho. Hojas superiores lineales, bracteiformes.

Capítulos pocos (2-7) sobre largos sustentáculos glabros o algo lanuginosos, provistos de algunas bracteolas lineales cortas, formando en conjunto una cima corimbiforme muy laxa. Involucro acampanado,



Fig. 7. — *Hypochoeris parodii* Cabr. (Parodi 14267).

durante la antesis de 10-12 mm de largo, por unos 10 mm de ancho, a la fructificación ligeramente alargado; brácteas involucrales dispuestas en varias series, lineales, obtusas, más o menos densamente hirsutas en el dorso con pelos leonados de 1,5-2 mm de longitud, ligeramente tomentosas en el borde, las externas de unos 5 mm de largo, por 0,6 mm de ancho; las intermedias de 8-10 mm de largo, por 1 mm de ancho; las interiores de hasta 13 mm de largo, por 1 mm de ancho. Páleas del receptáculo lineal-lanceoladas, hialinas, terminadas en un cirro y con un diente a cada lado en la parte superior. Flores numerosas, amarillas, sobresaliendo mucho del involuero, con tubo de unos 4 mm de largo y lígula de 9 mm de longitud, por 1,5 mm de anchura, pentadentada en el ápice. Aquenios fusiformes, rostrados, con cinco surcos longitudinales y numerosos surcos transversales: parte seminífera de 5-7 mm de largo; rostro delgado de 3-4 mm de largo. Pappus blanco, formado por una sola serie de pelos plumosos, de 5,5 mm de longitud.

Especie frecuente en los prados serranos y en los bosques de "alisos" (*Alnus jorullensis* var. *spachii*) del noroeste de la República Argentina.

Material estudiado: ARGENTINA. — CATAMARCA: Sierra de Ambato, Loma Larga, 1900 m s.m., leg. L. R. Parodi, 14267, II-1941 (Typus: LP.). Cuesta de Singuil, leg. Schickendantz, 63 (LP.). TUCUMÁN: Dep. Tafí, La Ciénaga, leg. H. A. Fabris, 1444 (LP.). Valle de Tafí, leg. C. Bruch, año 1908 (LP.). Tafí del Valle, 2500 m s.m., leg. S. Venturi, 2912, (SI.). Dep. Tafí, Cumbre del Siambón, 1500 m s.m., leg. S. Venturi, 2821 (SI.). Dep. Burroyaco, Cerro del Campo, 2000 m s.m., leg. S. Venturi, 7743 (SI.). Dep. Chieligasta, Estancia Las Pavas, 1700-2000 m s.m., leg. S. Venturi, 2967 (LP. SI.), 4005 (LP., SI.) et 4671 (LP., SI.). Dep. Tafí, Cumbre de Raco, leg. S. Venturi, 3591 (SI.). SALTA: Dep. Guachipas, Pampa Grande, 1600 m s.m., leg. A. T. Hunziker, 1818 (LP.). JUJUY: Dep. Capital, Quebrada del Jaire, camino a Tiracsi, leg. A. L. Cabrera, 14699 (LP.).

Especie relacionada con *H. chilensis* (H.B.K.) Britt., *H. elata* (Wedd.) Griseb y *H. tweediei* (H. et A.) Cabr. de las que se diferencia principalmente por las flores sobresaliendo mucho de los involucros.

Dedico esta nueva especie al eminente agrostólogo argentino Lorenzo R. Parodi quien coleccionó el ejemplar tipo.

HYPOCHOERIS SCORZONERAE (DC.) F. Muell.

Fig. 8

F. Mueller, *Select. Extra-Trop. Plants*: 163, 1881.

Achyrophorus Scorzonerae De Candolle, *Prodromus*, 7(1):94, 1838. "In fruticetis collium ad Quillota Chilensium legit cl. Bertero".

Hypochoeris sonchoides Bertero ex DC., *loc. cit.* (in synonym.).

Pueden reconocerse en esta especie dos variedades: