

dense albo-tomentosa; lamina 7-10 mm longa, 6-9 mm lata; petiolo 7-10 mm longo. Scapus brevisimus, albo-tomentosus, usque 1.5 cm altus. Capitulum solitarium. Involucrum hemisphericum, ca. 10 mm altum, ca. 15 mm crassum; bracteis involucralibus subbiseriatis, lanceolatis, acutis, dorso dense lanatis et minute glanduloso-pubescentibus. Flores albo-rosei: marginalibus tubo 4 mm longo; labio externo 6-7 mm longo, 2 mm lato et labio interno breviore. Achaenia (valde inmatura) papilloso-pubescentia. Pappus albū.

Holotypus: ARGENTINA. Prov. Neuquén, Parque Nacional del Nahuel Huapí, filo y planicie al sur del Cerro Fía, 1700 m s.m., leg. J. Diem 3311, 27-III-1966 (LP).

Hierba perenne, pigmea, rizomatosa, acaule. Rizoma oblicuo o vertical del que nacen numerosas raíces delgadas y rosetas de hojas amontonadas. Hojas espatuladas, obtusas en el ápice y atenuadas en corto peciolo en la base, crenado-dentadas en el margen, con uno a tres dientes cortos a cada lado, densamente albo-tomentosas en ambas caras; lámina de 7-10 mm de longitud, por 6-9 mm de anchura; peciolo plano, envainador, de 7-10 mm de longitud. Escapo muy corto, densamente albo-tomentoso, de hasta 15 mm de longitud. Capítulo solitario, con involucro hemisférico de unos 10 mm de altura, por 15 mm de diámetro; brácteas involucrales sub-biseriadas, lanceoladas, agudas, densamente lanosas en el dorso y con algunos pelitos glandulosos. Flores blanco-rosadas, las marginales con tubo de 4 mm de largo, labio exterior de 6-7 mm de largo por 2 mm de ancho, y labio interior más corto. Aquenios obovoideos, papiloso-pubescentes. Pappus blanco.

Especie endémica de las montañas de la provincia de Neuquén, Argentina.

MATERIAL ADICIONAL EXAMINADO:

NEUQUEN. Cerro Shaihueque, 1900 m.s.m, leg. J. Diem 3219 (LP); Rincón Grande, Cerro Bayo, leg. D. F. de Jones 109 (LP).

Especie muy característica por sus hojas pequeñas, espatuladas, crenadas, y por los capítulos casi sésiles.

HYPOCHOERIS PATAGONICA nov. sp.

Herba perennis rhizomatosa, rhizomate verticale vel obliquo, ramoso, 2-4 mm crasso, folia rosulata et caules scapiformes emitente. Folia lineare-lanceolata, apice acuta attenuataque, inferme longe attenuata, integra, dentata vel pinnatisecta (segmentis utrinque 1-4 linearibus), utrinque glabra, 30-110 mm longa, 1.5-8 mm lata. Scapi ascendentes erective, tenues, glabri, bracteis linearibus sparsis muniti, 4-18 cm alti. Capitulum solitarium, involucro cylindraceo-campanulato 12-15 mm alto, 8-10 mm crasso: bracteis involucralibus 4-5 seriatis, linearis-lanceolatis, apice subacutis attenuatis, dorso glabris vel tenuiter




Fig. 10. *Hypochoeris patagonica* Cabr.: A, planta ($x \frac{1}{2}$); B, hoja ($x 1$); C, hojas ($x 1$); D, capítulo ($x 2$); E, pálea del receptáculo ($x 5$); F, aquenio ($x 5$). (A y D, C. Spegazzini año 1882); B, Soriano 1447; C, Koslowsky XII-1902; E-F, Boelcke 12827.

arachnoideis, internis usque 2 mm latis. Paleae membranaceae, hyalinae, lanceolatae, superne 1-2-dentatae, apice longe aristatae. Flores multi, corollis ligulatis longe exertis: tubulo 6-7 mm longo; ligula 11-12 mm longa, 2.5-3.5 mm lata, apice pentadentata. Achaenia cylindracea, costata, supra costis transverse rugosa, superne attenuata sed non rostrata, 8-9 mm longa. Pappus plumosus, albus, uniseriatus, 8 mm longus.

Holotypus: ARGENTINA. Prov. Santa Cruz, Santa Cruz, leg. C. Spegazzini, anno 1882 (LP).

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma vertical u ublicuo, ramoso, de 2-4 mm de grosor, del que nacen rosetas de hojas y tallos escapiformes. Hojas lineal-lanceoladas, atenuadas y agudas en el ápice, largamente atenuadas en la parte inferior, enteras, dentadas o pinatisectas, con 1-4 segmentos lineales a cada lado, glabras en ambas caras, de 30-110 mm de longitud, por 1.5-8 mm de anchura (sin los lóbulos). Escapo ascendente o erecto, delgado, glabro, con algunas brácteas lineales, de 4-18 cm de altura. Capítulo solitario, con involucro cilíndraco-acampanado de 12-15 mm de altura, por 7-10 mm de diámetro: brácteas involucrales en 4-5 series, imbricadas, lineal-lanceoladas, atenuadas y subagudas en el ápice, glabras o ligeramente aracnoideas en el dorso (excepcionalmente con algunos pelos tiesos), las interiores de hasta 2 mm de anchura. Páleas membranáceas, hialinas, lanceoladas, con uno o dos dientes cerca del ápice, prolongadas en larga arista. Flores numerosas, con corola ligulada largamente exerta: tubo de 6-7 mm de largo: ligula de 11-12 mm de largo, por 2.5-3.5 mm de ancho, pentadentada en el ápice. Aqueños cilíndracos, costados, arrugados sobre las costillas, atenuados en la parte superior pero no rostrados, de 8-9 mm de longitud. Papus plumoso, blanco, uniseriado, de 8 mm de largo.

Especie endémica de Patagonia y Tierra del Fuego.

MATERIAL ADICIONAL EXAMINADO:

CHUBUT. De Choique-Vielhane al Lago Musters, 1897, S. Roth (LP); Nueva Lubecka, Estancia Laurita, A. Soriano 1447 (LP); Chubut, XII-1902, J. Koslowsky (LP).

SANTA CRUZ. Dep. Río Chico, al W. de Bajo Caracoles, Planicie del Río Blanco, C. Boelcke et al. 12827 (BAB).

TIERRA DEL FUEGO. Río Cullen, I-1933, A. Castellanos (BA. LP).