

810 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

*cretica.*

8. HYOSERIS fructibus ovatis scabris, caule ramofo.  
Lapsana fructibus ovatis scabris, seminibus disci calycu-  
lato-papposis. *Hort. ups.* 246. \*  
*Habitat in Creta.*

HYPOCHÆERIS.

*wrens.*

1. HYPOCHÆERIS foliis dentatis, caule ramofo folio-  
fo, calycibus hispida. †  
Hypochæris hieracii barbati folio, calyce hispido. *Vaill.*  
*act.* 1721. p. 215.  
Hieracium alpinum, dentis leonis folio acuto piloso pro-  
scisso, capitulis pungenti lanugine obfita. *Cup. cath.*  
95. *Raj. suppl.* 146.  
*Habitat in Sicilia.*  
Calycis squamæ asperæ spinulis pungentibus.

*Achyrophor.*

2. HYPOCHÆERIS calycibus æqualibus hispida. *Hort.*  
*cliff.* 385. \* *Hort. ups.* 240. \*  
Achyrophorus fere glaber, bellidis glauco dentatoque  
folio. *Vaill. act.* 1721. p. 278.  
Hieracium ramofo, floribus amplis, calycibus valde  
hirsutis, foliis oblongis obtusis: dentibus majoribus  
inæqualibus incilis. *Raj. suppl.* 144.  
*Habitat in Creta.* ☺

*pontana.*

3. HYPOCHÆERIS foliis lanceolatis dentatis, caule  
simplici foliofo unifloro.  
Hypochæris non ramofo, endiviæ folio prælongo, mo-  
nanthos. *Vaill. act.* 1721. p. 215.  
Hieracium latifolium pontanum præaltum glabrum, en-  
diviæ folio. *Bocc. mus.* 2. p. 148. t. 113. *Raj. suppl.*  
142.  
*Habitat in Sabaudia montibus.*

*maculata.*

4. HYPOCHÆERIS caule subnudo: ramo folitario, fo-  
liis ovato-oblongis integris dentatis. *Hort. cliff.* 385.  
*Fl. suec.* 631. *Roy. lugdb.* 125. *Dalib. paris.* 239.  
Hypochæris hirsuta, endiviæ folio, magno flore. *Vaill.*  
*act.* 1721. p. 385. *Fl. lapp.* 288.  
Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum, flore  
magno. *Bauh. pin.* 128.  
Hieracium latifolium 1. *Clus. hist.* 2. p. 139.  
Hieracium alpinum, foliis dentatis, flore magno. *Bauh.*  
*pin.* 128. *prodr.* 65. *Hall. helv.* 760. t. 24.  
*Habitat in Europæ frigidioris pratis asperis.* 4

5. HY-