

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu.  $\gamma$  (Willd.)

7. PORCELLE pinnatifide. *Hypocharis pinnatifida*. Cyr.

*Hypocharis foliis lanceolatis, pinnatifidis, subhirtis; scapo hirta, subramoso.* (N.)

Cette plante & la suivante se trouvent décrites dans les *Décades* de Cyrille: n'ayant pu me procurer cet ouvrage, je suis forcé de ne les présenter que d'après l'inspection de deux individus envoyés à M. Desfontaines, sans pouvoir citer l'ouvrage de Cyrille. Celle-ci s'y trouve sous le nom que je lui donne ici; la seconde annonce seulement qu'elle se trouve dans son ouvrage, sans citation de nom.

Cette plante est petite; ses racines sont brunes, un peu grêles, fusiformes; elles produisent des feuilles étroites, lancéolées, pinnatifides, presque glabres, longues de deux pouces; les lobes distans, courts, profonds, linéaires, dirigés vers le bas de la feuille, entiers, un peu obtus. Les hampe sont droites, grêles, pileuses, longues de quatre à cinq pouces, munies d'une ou de deux feuilles très-étroites, aiguës; ses pédoncules solitaires ou au nombre de deux ou trois, obliques, alongés, uniflores; le calice un peu hispide; ses folioles inégales, lancéolées, aiguës, membraneuses à leurs bords; la corolle jaune, petite.

Cette plante croît dans la Calabre. (*V. f. in herb. Desfont.*)

8. PORCELLE naine. *Hypocharis pusilla*.

*Hypocharis acaulis, foliis lanceolatis, erosis, subglabris; pedunculis radicalibus unifloris, subpubescentibus; foliis brevioribus.* (N.) — Cyrille.

Cette espèce est indiquée comme décrite dans les *Décades* de Cyrille, que je n'ai pu consulter. C'est une très-petite plante, dont les racines sont grêles; les feuilles toutes radicales, longues de deux pouces, lancéolées, obtuses, rongées ou laciniées profondément. Les lobes s'élargissent insensiblement jusque vers le sommet des feuilles; ils sont courts, presque glabres, un peu denticulés. Les pédoncules sortent immédiatement des racines; ils sont nus, plus courts que les feuilles, simples, uniflores, légèrement pubescens, surtout dans leur jeunesse; les folioles du calice linéaires, un peu blanchâtres & membraneuses; la corolle jaune, un peu plus longue que le calice.

Cette plante croît dans l'île d'Ischia, au royaume de Naples. (*V. f. in herb. Desfont.*)

\* PORCELLE uniflore. *Hypocharis uniflora*.

Var.  $\alpha$ , caule folioso longiore. — Illustr. tab. 66. fig. 2.

Var.  $\beta$ , caule subnudo, minore.

*Hypocharis minima*. Balb. Miscell. Alt. 29.

*Hypocharis Balbifii*. Loif. Not. 124. — Decand. Flor. franç. Suppl. 452. var.  $\beta$ .

Il y a eu quelque confusion dans l'exposition de cette espèce; toute la synonymie appartient à la variété  $\alpha$ , mais la description a été faite sur la variété  $\beta$ : peut-être même faudroit-il les considérer comme deux plantes différentes.

La variété  $\alpha$  a ses tiges bien plus élevées, simples, uniflores; garnie, dans toute sa longueur, de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, lancéolées, aiguës, inégalement dentées en scie à leurs bords, hérissées, principalement sur leurs nervures & à leur contour, de poils courts & roides. Dans la variété  $\beta$ , les tiges sont presque nues, au moins une fois plus courtes; les feuilles plus larges.

\* *Hypocharis* (dimorpha) *foliis obtusis, sinuato-dentatis, hispidis; scapo ramoso; pappo seminum marginalium sessili, disci stipitato*. Broter, Lusit. 1. pag. 332. In Lusitaniâ. Valdè similis *hypocharis arachnoidi*. An fortè varietas *foliis glaberrimis*?

\* *Hypocharis simplex*. Mérat, Flor. parif. p. 310.

Cette plante, que je ne connois pas, a été trouvée aux environs des étangs de Saint-Léger, par M. Thuillier. Sa hampe est longue de deux à quatre pouces, nue, glabre, un peu écailleuse, uniflore; les feuilles radicales ovales, petites, dentées, un peu ciliées; la fleur petite, terminale; le calice glabre; toutes les aigrettes presque sessiles.  $\odot$  (Mérat.) Elle n'est probablement qu'une simple variété de l'*hypocharis glabra*, distinguée par sa hampe simple, uniflore. Son calice glabre & non hérissé empêche de le confondre avec l'*hypocharis minima* Desfont.

PORÉE. (Voyez POIRÉE.)

PORELLA. (Voyez PORELLE.) J'ai dit qu'il avoit été reconnu que le caractère de ce genre étoit erroné, & que la plante à laquelle Linné l'avoit attaché devoit être réunie aux jongermanes; cependant Loureiro en décrit une seconde espèce d'après le caractère générique de Linné. Il est difficile de rien affirmer de positif sur cette mouffe, à moins de l'avoir sous les yeux; c'est pourquoi je me bornerai à la mentionner ici d'après Loureiro.

\* *Porella* (imbricata) *foliis lanceolatis, quinque-fariam imbricatis*. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 839.

Ses tiges sont droites, longues de trois pouces, rameuses; les feuilles imbriquées sur cinq rangs, lancéolées, linéaires, recourbées, ondulées, blanchâtres; une anthère sessile, nue, ovale, poreuse, à plusieurs loges; point de coiffe.

Cette plante croît aux lieux humides, à la Cochinchine. (Lour.)