

de largo y lámina oblanceolada o lanceolada, aguda en el ápice y atenuada en la base, entera o con algunos dientes distantes diminutos, con nervadura central muy conspicua y nervaduras laterales finamente reticuladas, laxamente pubescentes en el haz y densamente sericeo-velludas en el envés, de 9-15 cm de largo, por 2.5-4 cm de ancho.

Capítulos numerosos, cortamente pedunculados o subsésiles, dispuestos en panojas terminales triangulares de unos 15 cm de longitud, por 10 cm de anchura en la base. Ramas de la panoja delgadas, densamente sericeo-velludas. Involucro cilíndrico, de 8 mm de altura, por 3-4 mm de diámetro; brácteas involucrales 14-16, estramineas, espiraladas, en 3-4 series, las exteriores ovadas, obtusas, levemente velludas en el dorso, de 1.5-2.5 mm de largo, por 1 mm de ancho; las intermedias lanceoladas, agudas, casi glabras, ciliadas en el margen, de 4-6 mm de largo, por 1-1.2 mm de ancho; las internas lanceoladas, agudas, glabras, de 8 mm de largo, por 1 mm de ancho. Receptáculo plano, cortamente piloso. Flores 5, amarillas, isomorfas, con corola bilabiada de 8-9 mm de largo, con labio exterior tridentado y labio interior disecto. Anteras largamente sagitadas en la base. Estilo bifido, con ramas truncadas en el ápice, donde llevan una coronita de pelos. Aquenios (todavía inmaduros), cilíndricos, laxamente pubescentes, de 2 mm de largo. Pappus formado por una serie de cerdas fácilmente caducas, blancas, de 7 mm de longitud.

Especie muy característica por las inflorescencias en panoja triangular y los capítulos paucifloros. La dedico a uno de sus colectores, el joven botánico peruano doctor A. Sagástegui, de la Universidad de Trujillo.

#### HYPOCHOERIS SCHIZOGLOSSA nov. sp.

*Herba perennis, erecta, ca. 50 cm alta, caulibus scapiformibus, monocephalis, costatis, leviter pubescentibus vel glabris, bracteis linearibus brevibus, 1-1.5 mm longis munitis. Folia radicalia rosulata, linearilanceolata, apice acuta, basi in pseudopetiolo vaginante attenuata, integerrima, nervio medio conspicuo, lateralibus tenuibus, utrinque glabra, 15-18 cm longa, 3-4 mm lata. Capitulum solitarium, involucro hemisphaerico 12-15 mm altum, ca. 20 mm crassum; bracteis involucralibus 2-3-seriatis, linearilanceolatis, externis obtusis, intimis apice longe attenuatis, omnibus ad mediam partem obscuris, dorso pilis fuscis rigidis munitis, margine inferneque albo-lanosis, 8-18 mm longis, 1.2-1.8 mm latis; paleis receptaculi linearibus, membranaceis, utrinque unidentatis, nervo medio in arista producto, ca. 14 mm longis. Flores multi, lutei, tubulo 4 mm longo, ligula oblonga 8-18 mm longa, 2-2.5 mm lata, apice profunde pentasecta, segmentis linearibus 2-4 mm lon-*

*gis. Pappi setae uniseriatae, albae, plumosae, 8 mm longae. Achaenia (valde immatura) fusiformia, glabra, apice breviter rostrata.*

Perú. Depto. La Libertad, Prov. Bolívar, arriba de Longotea, 3200 m s.m., leg. A. López et A. Sagástegui, 3175, 27-V-1960 (Typus: LP.).

Hierba perenne, erecta, de unos 50 cm de altura. Tallos escapiformes, monocéfalos, costados, levemente pubescentes o glabros, con algunas brácteas lineales cortas (de 1-1.5 mm de largo). Hojas radicales arrosetadas, lineales-lanceoladas, agudas en el ápice y largamente atenuadas en la base en pseudopecíolo envainador, enteras, con nervadura central muy conspicua y nervaduras laterales tenues, glabras en ambas caras, de 15-18 cm de largo, por 3-4 mm de ancho. Capítulo solitario con involucreo hemisférico de 12-15 mm de altura por unos 20 mm de diámetro. Brácteas involucrales en 2-3 series, lineal-lanceoladas, las exteriores obtusas, las íntimas largamente atenuadas en el ápice, todas oscuras en el centro, con pelos rígidos y largos de color pardo claro a lo largo de la parte central, y albo-lanosas en los bordes y en la parte inferior, de 8-18 mm de largo, por 1.2-1.8 mm de ancho. Páleas lineales, membranosas, con un diente a cada lado, con nervadura central prolongada en larga arista, de unos 14 mm de largo. Flores numerosas, amarillas, con tubo de 4 mm de largo y lígula oblonga de 8-10 mm de largo, por 2-2.5 mm de ancho profundamente pentapartida en el ápice, con segmentos lineales de 2-4 mm de largo. Papus uniseriado, blanco, plumoso, de 8 mm de largo. Aquenios (todavía inmaduros) fusiformes, glabros, contraídos en el ápice en corto rostrc.

Especie parecida a *Hypochoeris andina* (DC.) Gris., de la que difiere principalmente por sus capítulos mucho mayores. *Hypochoeris graminea* Hieron. que también tiene hojas lineales, es más baja y con hojas de solo 10 cm de largo por 1 mm de ancho. *Hypochoeris sonchoides* H.B.K. tiene hojas lanceoladas dentadas en el borde.

Museo de La Plata  
División de Plantas Vasculares