

Subtribus V. HYPOCHOERIDEAE Lessing.

449. HYPOCHOERIS L.

2064. H. glabra L. — *Bmg.* 1701. — *Fl. dan.* t. 424. — Auf Triften, Wiesen, in Gras- und Obstgärten. Hermannstadt. Mai, Jul.

2065. H. subalpina Schur herb. Transs. — *H. radicata* var. a et 6. *Schur* sert. n. 1686. Caule 8—12—18 poll. magis minusve saepe a basi divaricato-ramoso interdum prostrato, ramis longissimis monocephalis squamatis. Foliis subsimplicibus, sinuato-dentatis, apice rotundato-obtusis, glabriusculis, vel densissime pilis brevibus longioribusque intermixtis piloso-hirtis. Anthodiis *H. radicatae* subsimilibus sed parum minoribus et peranthodii foliolis extus omnibus glabris (nec dorso setulosis). Fructibus omnibus longe rostratis. — Auf Wiesen und Triften in der Hügel- und Voralpenregion, in der letzteren kleiner und ästiger 1500'—5000'. Jun., Aug. Hermannstadt, Arpaser Gebirge. (An *H. Balbisii* Lois.?).

2066. H. radicata. L. — *Bmg.* 1702. — *Fl. dan.* t. 150. — *Tratt. Oestr.* t. 82. — Auf Wiesen Triften bebauten und unbebauten Orten. Jun., Aug.

450. ACHYROPHORUS C. H. Schultz.

(*Endlich.* gen. p. 496. *DC.* prodr. 7, p. 90. *Scopol.* carn. ed. 2, II., 116.)

2067. A. maculatus Scop. carn. ed. 2, 116. *Ledeb.* Ross. 2, 776. (*Hypochoeris maculata* L. — *Bmg.* 1700. — *Fl. dan.* t. 149. — *Tratt. Oestr.* t. 83.)

a. **alpicola.** Caule gracillimo 12 poll. monocephalo, submonophyllo, superne squamato, sulcato-striato, scabro. Foliis radicalibus obovato-oblongis versus basin angustatis sed vix petiolatis circumcirca dentatis, acutis albo-pilosis, immaculatis. Capitulo minori hirsuto. Ovariis omnibus brevissime rostratis. Fructibus? — (*Schur* Sert. n. 1687, var. a. = *A. alpicolus* *Schur* herb. Transs.) — Auf dem Korondsys bei Rodna. Kalk. Jul. 5000'.

b. **alpestris.** Caule monocephalo; foliis ellipticis mollibus, hirsutis, obsolete denticulatis. — Auf dem Arpás. 6000'. Jul.

c. **obtusifolius.** Foliis ovalibus rotundato-obtusis fusco-maculatis. — Bergwiesen bei Hermannstadt. 3000'. Jul., Aug.

d. **ramosissimus.** Caule 3 ped. a medio ramoso, ramis 1-oligocephalis. Anthodiis maximis nigro-pilosis. Flosculis aureis, marginalibus extus fuscis. Foliis radicalibus maximis sanguineo-maculatis, inciso-dentatis vel laceris. (*Schur* Sert. var. b.) — Auf Wiesen bei Hermannstadt, Klausenburg, Kronstadt. Jul. Aug.

2068. A. helveticus Schur herb. Transs. = *A. uniflorus* *Schur* sert. n. 1688 (nomen ineptum, melius monocephalus). — (*Hypochoeris uniflora* Vill. delph. 1799, p. 37. — *Bmg.* 1699. — *H. helvetica* Wulf. in *Jacq. misc.* 2, p. 25; *icon. rar.* t. 165.) — Auf Felsen und Triften der