

## Pappus difformis.

HYPOCHAERIS. *Gaertner* 2. p. 374. t. 160.

Calyx imbricatus. Corollulae hermaphroditae.  
Pappus plumosus: radii sessilis: disci stipitatus.  
— *glabra*, *Linn*, calycibus glabris oblongis, caule ramoso  
nudo, foliis dentato - sinuatis.

Hypochoeris foliis semipinnatis hirsutis; caule  
nudo ramoso. *Haller. hist. n. 3.*

Achyrophorus radicatus. *Scopoli fl. Carn.* 2.  
p. 117.

Hypochoeris Chondrillae folio, flore parvo,  
*Vaillant, Act. Paris.* 1721.

Hypochoeris porcellia. *Tabernaem.* p. 179.  
*Icon Oederi.* t. 424.

h. inter segetes prope Münchhausen. Annua.

— *saraxacifolio*, foliis runcinato-dentatis scapo erecto  
ramoso, calycibus conicis pilosis.

Radix fusiformis. Folia radicalia oblonga,  
basin versus dentata, obtusa, subpilosa, pilis  
rigidis, in petiolum decurrentia. Scapus pedalis  
teres, laevis, superne pilosus. Calyx conicus  
foliolis lanceolatis margine membranaceis, ca-  
rina pilosa: pilis albis rigidis patulis.

Flores linea 6 in diametro. Corollulae utri-  
que luteae quinquedentatae. Pericarpia oblonga.

h. H. Annua.