

Vive en abras con suelo arenoso del sur del Paraguay y de la Provincia de Misiones en la Argentina.

*Material estudiado:* PARAGUAY. — Paraguari, Ybytina, leg. J. E. Montes, 12991, 13-X-1952 (Typus: LP.). Del Guaira a Iturbe, leg. J. E. Montes, 12557 (LP.).

ARGENTINA. — MISIONES: *Dep. Iguazú*, Puerto Esperanza, leg. J. E. Montes, 10273 (LP.).

Esta especie recuerda, por su aspecto a *H. microcephala* (Sch. Bip.) Cabr., pero por sus aquenios sin rostro se distingue fácilmente de ésta y otras especies afines.

**HYPOCHOERIS TROPICALIS** var. **AUSTRALIS** nov. var.

Fig. 11

*Herba perennis, caulibus ascendentibus, subscapiformibus, simplicibus vel ad basem tantum divisis, monocephalis. Folia irregulari-*




Fig. 11. — *Hypochoeris tropicalis* var. *australis* Cabr. (Pedersen 6129).

*ter pinnatisecta, rachi segmentisque linearibus, inferne in vena media longe hirsuta. Achaenia erostrata, 4,5-6 mm longa.*

Difiere de la variedad *tropicalis* por los tallos ascendentes, simples o solo divididos en la base, monocéfalos, y por los aquenios algo menores, de 4,5-6 mm de longitud.

Esta parece ser la variedad más frecuente, hallándose desde el sur del Paraguay hasta la Provincia de Entre Ríos, en la Argentina, y el noroeste del Uruguay.

*Material estudiado:* ARGENTINA. — CORRIENTES, Dep. Mercedes Estancia Itá-Cambó leg. T. M. Pedersen, 6129, 14-X-1961 (Typus varietatis: LP.). Dep. Santo Tomé, Puerto Garruchos, leg. A. L. Cabrera, 11949 (LP.). Tres Cerros, leg. A. Burkart, 8-XI-1936 (LP.). ENTRE RÍOS: Federación, leg. A. Burkart, 22800 (LP., SI.). Concordia, leg. M. Biraben, 5149 (LP.).

PARAGUAY. — Dep. MISIONES, San Juan Bautista, leg. T. Rojas, 5729 (LP.)

URUGUAY. — Dep. ARTIGAS: Catalán, leg. W. G. Herter, 82726 (LP.). Dep. SORIANO: Juan Jackson, leg. Gallinal et al. 773 (LP.).

División Plantas Vasculares  
Museo de La Plata