

810 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

cretica.

8. HYOSERIS fructibus ovatis scabris, caule ramofo.
Lapsana fructibus ovatis scabris, seminibus disci calycu-
lato-papposis. *Hort. ups.* 246. *
Habitat in Creta.

HYPOCHÆERIS.

wrens.

1. HYPOCHÆERIS foliis dentatis, caule ramofo folio-
fo, calycibus hispidis. †
Hypochæris hieracii barbati folio, calyce hispido. *Vaill.*
act. 1721. p. 215.
Hieracium alpinum, dentis leonis folio acuto piloso pro-
scisso, capitulis pungenti lanugine obfritis. *Cup. cath.*
95. *Raj. suppl.* 146.
Habitat in Sicilia.
Calycis squamæ asperæ spinulis pungentibus.

Achyrophor.

2. HYPOCHÆERIS calycibus æqualibus hispidis. *Hort.*
cliff. 385. * *Hort. ups.* 240. *
Achyrophorus fere glaber, bellidis glauco dentatoque
folio. *Vaill. act.* 1721. p. 278.
Hieracium ramofo, floribus amplis, calycibus valde
hirsutis, foliis oblongis obtusis: dentibus majoribus
inæqualibus incilis. *Raj. suppl.* 144.
Habitat in Creta. ☺

pontana.

3. HYPOCHÆERIS foliis lanceolatis dentatis, caule
simplici folioso unifloro.
Hypochæris non ramofo, endiviæ folio prælongo, mo-
nanthos. *Vaill. act.* 1721. p. 215.
Hieracium latifolium pontanum præaltum glabrum, en-
diviæ folio. *Bocc. mus.* 2. p. 148. t. 113. *Raj. suppl.*
142.
Habitat in Sabaudia montibus.

maculata.

4. HYPOCHÆERIS caule subnudo: ramo folitario, fo-
liis ovato-oblongis integris dentatis. *Hort. cliff.* 385.
Fl. suec. 631. *Roy. lugdb.* 125. *Dalib. paris.* 239.
Hypochæris hirsuta, endiviæ folio, magno flore. *Vaill.*
act. 1721. p. 385. *Fl. lapp.* 288.
Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum, flore
magno. *Bauh. pin.* 128.
Hieracium latifolium 1. *Clus. hist.* 2. p. 139.
Hieracium alpinum, foliis dentatis, flore magno. *Bauh.*
pin. 128. *prodr.* 65. *Hall. helv.* 760. t. 24.
Habitat in Europæ frigidioris pratis asperis. 4

5. HY-