

Даур., Верхне-Зей., Нижне-Зей., Уссур. (Рис. 81). — Среди куст., в дубняках, по обочинам дорог, на злаково-разнотравных лугах. VI—VIII, VIII—IX. — **Общ. распр.:** Вост. Сиб.; Яп.-Кит. — Описан из Сибири.

**Прим.** Варьирует по высоте ст., расщепленности л. пласт., окраске цв., дл. об., с-к и хох. Отличия *I. strigosum* от *I. gramineum* нечеткие, возможно, следует рассматривать его только в ранге разновидности. Близкий вид — *I. chinense* (Thunb.) Tzvel. распространен на юге Китая, на о-вах Тайвань и Рюкю (Нансей), в Индокитае (Kitamura, 1935).

## 2. *I. kurilense* Barkalov, sp. nova.\* — **И. курильский.**

Раст. 30 см выс., голое, с нитевидными столонами. Ст. тонкие, б. м. разветвленные. Л. цельнокрайные или с немногими зубчиками; прикор. л. линейно-ланцетные или ланцетные, 1.5—4 см дл. и 3—8 мм шир., острые, в основании клиновидные; чер. почти равные л. пласт., с немногими мелкими зубчиками, при основании расширенные; ст. л. в числе 1—2, линейно-ланцетные, 1.8—3.5 см дл. и 1.2—4.5 мм шир., нижн. — на длинном чер., верхн. — сидячий, при основании с мелкими зубчиками, нестеблеобъемлющие. Корз. в числе 3—8, гомогамные. Об. цилиндрическая, при цв. 6.5—8 мм дл. и 2 мм шир.; ее наружн. л-чки яйцевидные, внутр. — линейно-ланцетные, по краю пленчатые, на верхушке коротковолосистые. Цв. желтые, язычковые, 8—10 мм дл. С-ки 4.5—5 мм дл., с носиком 1—1.5 мм дл.; хох. 4.5—5 мм дл., буроватый. (Табл. XXXI).

Южно-Кур. (Рис. 82). — На сырых разнотравных лугах. VIII—IX. — ?Эндем. — Описан из Сахалин.: «Курильские о-ва, о-в Кунашир, окр. пос. Южно-Курильск, на сыром лугу, 8 VIII 1983, В. Ю. Баркалов» (тип — VLA).

## 3. *I. dentatum* (Thunb.) Tzvel. 1964, Фл. СССР, 29 : 392. — *Prenanthes dentata* Thunb. 1784, Fl. Jap. : 301. — **И. зубчатый.**

Раст. до 50 см выс., голое. Ст. прямые, простые или разветвленные. Прикор. л. обратнотланцетные или продолговато-обратнотланцетные, 2—15 см дл. и 1—3 см шир., тупые или заостренные, зубчатые, перистолопастные или почти перисторассеченные, в основании клиновидные, с узко окрыленными чер.; ст. л. продолговато-ланцетные, сидячие, стеблеобъемлющие, реже — нижн. из них с широко окрыленными стеблеобъемлющими чер., при основании с закругленными зубчатыми ушками; зубцы с б. м. длинными острями. Корз. многочисленные, гомогамные, в щитковидно-метельчатом общ. соцв. Об. 7—9 мм дл. и 2—3 мм шир. Цв. желтые или желтовато-белые, по отцветании с розоватым оттенком, язычковые, 8—9 мм дл., голые. С-ки 3.5—5 мм дл., с носиком 1—1.5 мм дл.; хох. 4—5 мм дл., буроватый. 2п=20 (Соколовская, Пробатова, Рудыка, 1985). (Табл. XXXI).

Южно-Кур. (Рис. 83). — На приморских песках и галечниках, по обочинам дорог, в смешанных лесах. VII—IX. — **Общ. распр.:** Яп.-Кит. (п-ов Корея, Япония). — Описан из Японии.

### Род 97. ПАРАИКСЕРИС — *PARAIXERIS* Nakai

8—10 видов, распространенных в Юго-Вост. Азии. В СССР — 3 вида. Лесные раст. Однол. или двул.

1. Внутр. л-чков об. 4—6. Средн. ст. л. перисторассеченные или почти перисто-раздельные; чер. б. м. длинные, при основании с обособленными ушками. Цв. с голой трубкой венч. . . . . 3. ***P. chelidoniifolia***
- Внутр. л-чков об. 7—9. Средн. ст. л. цельные, от почти цельнокрайных до перистолопастных, если перисто-раздельные, то сидячие, с глубоко стеблеобъемлющим основанием или короткочерешчатые, при основании чер. без ушек . . . . . 2

\* Ab *I. dentato* (Thunb.) Tzvel. stolonibus filiformibus, foliis haud amplexicaulis, basi haud auriculatis sed minute denticulatis differt. — Typus: Insulae Kurilenses, ins. Kunaschir, in vicinibus pagi Yuzhno-Kurilsk, in prato humido, 8 VIII 1983, V. Yu. Barkalov — VLA.



Таблица XXXI

А — *Youngia tenuifolia*, нижняя часть растения (а — верхняя часть растения с корзинками), Б — *Ixeridium dentatum*, нижняя часть растения (б — веточка с корзинками), В — *I. kurilense*, общий вид (в — семянка), Г — *Paraixeris chelidoniifolia*, Д — *Chorisis repens*, часть растения с корзинками (д — корзинка с сеянками).