

Conandron ramondioides var. *pilosum* f. *variagatum* NAKAI.

Folia flavido- vel albo-variegata.

Patria ignota; in Horto Botanico Koishikawense culta.

Conandron ramondioides var. *leucanthum* NAKAI.

Folia eximie rugosa margine subcrispula, subtus supra venas dense erecto-pilosa. Inflorescentia patentim glanduloso-pilosa. Pedicelli albi apice purpurascens. Calyx purpureus pilosus. Corolla alba.

Patria ignota; in Horto Botanico Koishikawense culta.

839) *Ixeris dentata* NAKAI, Fl. Sylv. Kor. XIV. p. 114 (1923).

Syn. *Prenanthes dentata* THUNBERG, Fl. Jap. p. 301 (1784).

Ixeris Thunbergii A. GRAY in Mem. Americ. Acad. Arts & Sci. New Ser. VI. p. 397 (1859).

Lactuca Thunbergii MAXIMOWICZ in Mém. Biol. IX. p. 361 (1873).
var. *atro-purpurea* NAKAI.

Caulis, folia et involucrium atro-purpurea.

Hab. in Hondo.

840) *Solidago Virgaurea* LINNÆUS, Sp. Pl. p. 880 no. 9 (1753).

var. *præfloreus* NAKAI, var. nov.

Caulis apice ramosus. Flores in Maio-Junio.

Hab.

in insl. Hachijyo (T. NAKAI-typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

In the island of Hachijyo the ordinary variety (*Solidago Virgaurea* var. *asiatica* NAKAI) common in East Asia is not found as yet, but two *Solidagos* substitute it; one being this early flowering variety, and the other *Solidago hachijyoensis* NAKAI, sp. nov.

Solidago Virgaurea LINNÆUS var. *leiocarpa* NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXXI. p. 111 (1917), in nota sub var. *coreana*.

Syn. *Amphirhapis leiocarpa* BENTHAM in HOOKER, Lond. Journ. Bot. I. p. 480 (1842).

Hab.

Liukiu: insl. Okinawa (Y. TASHIRO); ibidem (T. MIYAGI).

Distr. China.

Solidago Virgaurea LINNÆUS var. *alpina* BIGELOW, Fl. Bost. ed. 2. p. 307 (1824).

Syn. *Solidago alpestris* WALDSTEIN & KITAIBEL, Pl. Rar. Hung. ex WILLDENOW, Sp. Pl. III. p. 2065 (1800)-WALDSTEIN & KITAIBEL, Descrip. & Icon. Pl. Rar. Hung. III. Pl. 208 (1812).

Solidago Virga-aurea var. *alpestris* A. P. DE CANDOLLE, Prodr. V. p. 338 (1836).

Solidago Virga-aurea forma VIII ROUY, Fl. Franc. VIII. p. 107