

DCCCXXXIII. IXERIS Cass. *bull. philom.* 1821. p. 173. *dict.* 24. p. 50. — Chondrillæ sp. *Wall.*

Capitulum multiflorum. Invol. ovatum, constans squamis 6-8 uniserialibus et squamellis 3-5 minimis ad basin calyculum constitutis. Recept. nudum. Achænia oblonga acutè 10-costata rostrata, costis laevibus. Pappus pilosus 1-serialis albissimus. — Herbae annuae Asiaticæ glabrae ramosæ, habitu Lactucæ seu Sonchi. Folia elongata, integerrima seu pinnatifida. Caules apice nudi corymboso-polycephali. Flores flavi aut variantes purpurei seu albi.

1. I. POLYCEPHALA (Cass. *dict.* 24. p. 50), caule simplici seu apice ramoso, foliis linearisubulatis, inferioribus coufertis semiamplexicaulibus sagittatis acutè et subretrosum dentatis subtus pilosulis, superioribus basi acutissimè sagittatis remotis. (1) in Nepaliâ legit cl. Wallich! et in montanis Indiae or. ad Sohedgunj, Gorukpore et Bagduar cl. Hamilton! Chondrilla tenuis Ham. in Wall. *cat.* n. 3274. comp. n. 384. et Chondrilla longifolia Ham. ibid. Folia 4-6 poll. longa, 3-4 lin. lata. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)
2. I. FONTINALIS, caule à basi multiplici, foliis glaberrimis, insimis obtuse semi-amplexicaulibus, cæteris acuminato-sagittatis pinnatifidis, lobis acuminatis distantibus, foliis summis latioribus subdentatis. (1) in Nepaliâ, verisimiliter ex nomine ad fontes, legit cl. Wallich. Chondrilla fontinalis Wall. *cat.* n. 3268, comp. 378. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)
3. I. VERSICOLOR, caule parçè ramoso, foliis linearisublanceolatis integerrimis dentatis aut pinnatilobatis, caulinis semiamplexicaulibus obtusis aut brevissimè sagittatis, paniculâ subcorymbosa laxa. (1) in montosis lapidosis Chinæ borealis et Dahuriæ leger. cl. Patrin, Turczaninow, etc. Crepis versicolor Fisch. in litt. 1822. Lagoseris versicolor Fisch. in Link enum. 2. p. 289. Prenanthes versicolor Turcz. in litt. 1829. Barkhausia versicolor Spreng. *syst.* 3. p. 651. Herba elegans valde variabilis: 1°. quoad folia integerrima, dentata, pinnatifida aut pinnatipartita, ad basin breviter sagittata aut obtusa; 2°. quoad flores flavos, aurantiacos, lilacino-purpureos et albos. Ad Ixerideum relata ob achænia longitudinaliter et acutè 10-costata nec transversè rugulosa. Rostrum achæniī longitudini æquale. (v. s.)

+ *Species exclusa.*

I. MONOCEPHALA Cass. = Macrorhynchus pumilus.

DCCCXXIV. MACRORHYNCHUS Less. *syn.* 139.

Capit. multiflorum. Invol. campanulatum imbricatum pauciseriale, squamis linearisublanceolatis acuminatis, exterioribus foliaceis, inter. glabris corollas æquantibus. Recept. nudum. Achænia glabra, teretuscula, costis numerosis nunc alæformibus (ut in Ixeride) nunc callososuberosis exarata, apice in rostrum longum gracillimum attenuata, basi areolâ callosâ instructa. Pappus pilosus albissimus pluriserialis. — Herbae Chilenses annuae villoso-canescentes 3-12-pollic. Radix exilis. Caulis basi simplex aut multiplex, imâ basi foliatus, apice longè aphyllus 1-cephalus apice villosus. Folia subradicalia linearisublanceolata, integerrima aut dentata aut ferè pinnatifida, caule duplò triplò breviora. Cor. luteæ per anthèsin invol. vix æquales. Achænia pallida, costis obtusis laevibus.

1. M. PTEROCARPUS (Fiech. et Mey. *ind. sem. h.* petr. 1835. p. 41. 1837. p. 40.), invol. squamis exterioribus subsquarroso villis albis hirsutis, achæniis alato-