

Formosa : Urai (Eiji MATSUDA, TAKIYA KAWAKAMI et SHUN-ICHI SASAKI). Agioku 1200 ped. (BUNZŌ HAYATA).

536) *Ixeris nipponica*, NAKAI.

Lactuca nipponica, NAKAI in schéd. Herb. Imp. Univ. Tokyo.

Biennis. Tota glabra glaucina. Caulis cum inflorescentia quam 12 cm. humilior apice ramosus. Folia radicalia rotundata v. ovata petiolata apice mucronata remote papilloso-serrata. Folia caulina basi auriculato-amplexicaulia oblonga integra repanda v. remote paucidenticulata. Capitula corymbosa. Calyculi minimi 5. Involucrum 8 bracteatum oblongo-cylindricum. Flores omnes ligulati flavi. Semina non vidi.

Nom. Jap. Iso-nigana.

Hab.

Hondo : in littore Kashiwazaki prov. Echigo (MASAO NAKAMURA).

537) *Ixeris sonchifolia*, (BUNGE) NAKAI comb. nov.

Prenanthes sonchifolia, BUNGE Enum. Pl. China bor. n. 226 (1830).

Lactuca denticulata var. *sonchifolia*, MAXIMOWICZ in Mél. Biol. IX. p. 359 (1874). PALIBIN Consp. Fl. Kor. I. p. 123.

L. sonchifolia, (non WILDENOW) DEBAUX Fl. Tschefou p. 90
KOMAROV Fl. Mansh. III. p. 781.

L. Bungeana, NAKAI Fl. Kor. II. p. 56 (1911).

L. Senecio, LÉVEILLÉ et VANIOT in FEDDE Rep. (1910) p. 141 quoad plantam e Quelpaert.

Youngia serotina, MAXIMOWICZ Prim. Fl. Amur. p. 180.

Nom. Jap. Chōsen-yakushisō.

Nom. Kor. Shinbagu.

Hab.

Corea :

Phyōng-an bor. : Shingishu (MASATOMI FURUMI n. 44). in monte Ha-kuhekisan (TSUTOMU ISHIDOYA). Kangei (MILLS n. 216).

Phyōng-an austr. : in monte Matenrei (AINOSUKE MISHIMA). Heijō (T. NAKAI). Genzan (T. NAKAI).

Kyōng-geui : Kōryō (TAMEZŌ MORI). in monte Reikisan circa Suigen (HOMIKI UEKI n. 291). in monte Nanzan (NOBUTOSHI OKADA). Kōyō (TOMIJIRŌ UCHIYAMA). Koonpo insulæ Hōtō (YOSHIKATA HANABUSA). in monte Hökkanzan (TOMIJIRŌ UCHIYAMA). Suigen (HOMIKI UEKI). in petrosis Seoul (FAURIE n. 430). in parietibus Seoul (FAURIE n. 1136).

Kyong-san bor : Andong (R. K. SMITH).

Kyong-san austr. : Fusun (MOTOGORŌ ENUMA, T. NAKAI) in montibus