

de même longueur qu'eux. Soies de l'aigrette intérieure à base scariéuse dentée et disjointe de la soie au sommet ; les soies extérieures lancéolées ou oblongues. Feuilles étalées, sinuées-pennatifides, à lobes plus ou moins distants. Tiges scapiformes, étalées, ascendantes, 2-5 flores, à rameaux étalés. Plante annuelle pubescente et plus ou moins hispidule.— Fl. avril, mai.

Cultures et lieux herbeux : vallée du Chélif, sous Miliana.

Kalbfussia parvifolia.

Péricline pubescent ou hispidule. Akènes d'un pourpre noir, à crêtes très-rapprochées et obtuses, assez brusquement atténuées en bec plus court que la base dans les akènes intérieurs. Soies intérieures de l'aigrette à base étroitement membraneuse, lancéolée ; les extérieures rares, courtes et piliformes. Feuilles étalées, petites, sublinéaires, subpectinées, à lobes ovales ou lancéolés, subégaux, rapprochés, entiers ou dentés. Tiges scapiformes, étalées, ascendantes, 1-3 flores, un peu épaissies vers le haut, non contractées sous la calathide. Plante annuelle glabrescente. — Fl. avril.

Lieux sablonneux du Sahara : Berezina.

Kalbfussia Kralikii.

Péricline glabrescent. Akènes gris, très-insensiblement atténués en bec, à crêtes presque embriquées et scariéuses, frangées ; soies de l'aigrette intérieure étroitement lancéolées et non dentées à la base, les extérieures rares et piliformes. Feuilles étalées, pennatifides, à lobes lancéolés aigus, plus ou moins profonds. Tiges scapiformes, étalées, redressées, grêles, 2-5 flores, à rameaux divergents. Plante annuelle pubérulente.

Bords des champs : Gabès (Kralik, exs., n° 260).

NOTA. Le *K. Mulleri Schulz* de Sardaigne diffère de tous

les précédents par ses akènes extérieurs, fortement atténués au sommet.

Vigneixia.

Péricline double, l'extérieur très-grand, formé de cinq folioles cordiformes, égales, dressées; l'intérieur à folioles (8), unisériées, égales. Akènes extérieurs oblongs, fusiformes, un peu arqués, non rostrés, terminés en cupule subdentéculée, ceux du disque atténués brusquement en un long bec grêle et fragile, surmonté d'une aigrette unisériée, à soies plumeuses, à peine épaissies à leur base; réceptacle presque nu.

Diffère de *Helminthia* au même titre que *Thrinicia de Leontodon*.

Vigneixia Balansæ (*Helminthia Balansæ*. — Coss. Dur.).

Calathides très-caduques sur des pédoncules fistuleux contractés au sommet. Folioles du péricline terminées par un long acumen hérissé qui égale ou dépasse l'aigrette. Akènes extérieurs couverts de courtes écailles fimbriées; les intérieurs plus petits, obovés, couverts de rugosités transversales espacées, presque écailleuses sous le bec, qui est trois fois aussi long qu'eux. Feuilles lancéolées, oblongues, sinuées ou entières, pétiolées, les supérieures embrassantes. Tige dressée, très-rameuse, à rameaux dressés, subdichotomes, disposés en corymbe. Plante annuelle, toute couverte de soies glabres; fleurs jaunes. — Fl. mai.

Terrains argileux: Dahra, Oued-el-Hammam-bou-Hanefia,

Deckera (Schulz).

Ce genre est bien différent de *Helminthia* par son péricline embriqué, irrégulièrement caliculé, par ses akènes atténués en bec robuste, persistant et non grêle et fragile, par l'aigrette à soies fragiles et caduques.