

de même longueur qu'eux. Soies de l'aigrette intérieure à base scariée dentée et disjointe de la soie au sommet ; les soies extérieures lancéolées ou oblongues. Feuilles étalées, sinuées-pennatifides, à lobes plus ou moins distants. Tiges scapiformes, étalées, ascendantes, 2-5 flores, à rameaux étalés. Plante annuelle pubescente et plus ou moins hispidule. — Fl. avril, mai.

Cultures et lieux herbeux : vallée du Chélif, sous Miliana.

**Kalbfussia parvifolia.** = *K. Mulleri*

Péricline pubescent ou hispidule. Akènes d'un pourpre noir, à crêtes très-rapprochées et obtuses, assez brusquement atténuées en bec plus court que la base dans les akènes intérieurs. Soies intérieures de l'aigrette à base étroitement membraneuse, lancéolée ; les extérieures rares, courtes et piliformes. Feuilles étalées, petites, sublinéaires, subpectinées, à lobes ovales ou lancéolés, subégaux, rapprochés, entiers ou dentés. Tiges scapiformes, étalées, ascendantes, 1-3 flores, un peu épaissies vers le haut, non contractées sous la calathide. Plante annuelle glabrescente. — Fl. avril.

Lieux sablonneux du Sahara : Berezina.

**Kalbfussia Kralikii.** = *K. Mulleri*

Péricline glabrescent. Akènes gris, très-insensiblement atténués en bec, à crêtes presque embriquées et scariées, frangées ; soies de l'aigrette intérieure étroitement lancéolées et non dentées à la base, les extérieures rares et piliformes. Feuilles étalées, pennatifides, à lobes lancéolés aigus, plus ou moins profonds. Tiges scapiformes, étalées, redressées, grêles, 2-5 flores, à rameaux divergents. Plante annuelle pubérulente.

Bords des champs : Gabès (Kralik, exs., n° 260).

NOTA. Le *K. Mulleri* Schulz de Sardaigne diffère de tous