

Hab. in umbrosis rupestribus regionis inferioris montis *Cassii* et *Antilibani* suprà *Zebdani*. Legi Maio 1846.

Affinis præcedenti a quâ differt indumento glanduloso partis inferioris plantæ, foliis vix lyratis pinnatipartitis segmentis copiosioribus, caule multò ramosiori polycephalo pedunculis brevioribus, involuci phyllis livescentibus radio breviori. *L. intermedia* characteribus in Diagnosi præcedenti datis longius differt. *L. adenophora* denique tota ad apicem usquè glandulosa est, habet prætereà folia lyrata, paniculam contractissimam, phylla ad medium setosa ctc.

LAMPSANA RAMOSISSIMA Boiss.

L. biennis, infernè parcè pilis albis sparsis patulis flexuosis obsita supernè glaberrima, caule ferè a basi dichotomè ramosissimo effusimè paniculato, foliis radicalibus lyratis lobis lateralibus utrinquè 3-4 oblongis subretrorsis acutis repando-dentatis terminali 2-3 plò longiori oblongo vel e basi truncato-subcordatè triangulari acuto, foliis caulinis paucis linearibus acutis rameis brevissimis setaceis, pedunculis gracillimis capitulo obconico 6-8 plò longioribus, involuci basi brevissimè calyculati phyllis viridi-sublivescentibus glabris vel infernè puberulo-glandulosis apice membranaceis acutiusculis, flosculis radii involucro subduplici longioribus.

Hab. in *Libano* suprà *Cedros*, in lapidosis regionis inferioris *Hermonis* suprà *Rascheya*.

Speciei præcedenti valde affinis sat tamen differre videtur caule a basi ramoso non glanduloso, capitulis paulò minoribus, involuci phyllis apice membranaceo-attenuatis. — Species ternæ hic descriptæ forsan inter se nimis affines sed donec specimina *intermedia* eas formas unius speciei polymorphæ esse docuerint eas seorsim proponere debui.

KÆLPINIA SESSILIS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

K. annua caulibus brevissimis sub anthesi sæpiùs nullis, foliis glaucis glabris linearibus brevibus integerrimis, capitulis ad collum et secundis ramos sessilibus minimis, involuci phyllis adpressis lanatis elliptico-linearibus albo-marginatis, acheniis striatis dorso aculeis patulis hamatis obsitis pretereà glabris in capitulis diversis dissimilibus aliis elongatis semicirculariter incurvis apice subampliatis vix bifidis, aliis

crassioribus brevioribus arctè revoluto-subcircinnatis apice longissimè et divaricatim bipartitis.

Hab. in aridis provinciæ *derbidjan* (Aucher N° 4875), in argillosis salsis propè *Teheran* (Kotschy N° 60).

Plantula nana cuius specimina prorsùs acaulia habitu *Plantaginem Creticam* referunt. Folia 8-10 lin. longa basi lineam lata, capitula illis *K. linearis* minora. A *Kælp. linearis* eximiè distincta foliis multò brevioribus pro longitudine latioribus, capitulis sessilibus nec longè pendunculatis, acheniis dimorphis præter aculeos dorsales non scabridis.

ROBERTIA TENUIFLORA Boiss.

R. foliis omnibus radicalibus oblongo-linearibus sub lente parcè setosis viridibus runcinato-pinnatilobatis lobo terminali majori, scapis tenuissimis folia vix duplò superantibus supernè squamulis paucis obsitis, capitulis parvis paucifloris, involuci phyllis planis albo-puberulis nigricantibus albomarginatis infernè longè et parcè crinitis ab exterioribus ad intima elongatis paucis, ligulis concoloribus, receptaculi paleis membranaceis linearì-acuminatis achenia superantibus, acheniis transversè rugosis breviter attenuato-rostratis, pappi plumosi setis basi vix dilatatis.

Hab. in insulâ *Cretâ* ubi legi cl. Prof. Raulin.

Planta bipollicaris, folia eis *R. taraxacoides* minus profundè divisa vix sesquipollicaria, scapi eis hujus duplò tenuiores, capitula minora; ab eâ insuper differt phyllis inæquilongis nec æquilongis exactèque uniserialibus, acheniis apice breviter attenuatis. Hæc planta habet faciem *Deloderii* sed hoc subgenus ab eâ differt receptaculo subnudo, acheniis longè rostratis, pappi setis paucis basi paleaceo-dilatatis, plurimulis deciduis.

HAGIOSERIS Boiss.

Capitulum multiflorum. Involuerum biseriale squamis exterioribus linearibus patulis interioribus incurvis convoluto-cymbiformibus achenia radii foventibus apice longè acuminatis tandem deciduis. Receptaculum nudum. Achenia teretiuscula transversè rugosa exteriora valdè incurva pappo brevissimo coroniformi fimbriatulo superata interiora