

нашелся новый вид этого рода, отличия которого выражены в ключе; он встречается, однако, реже рассматриваемого обыкновенного вида и обладает несколько отличною экологией. Цв. V—VI.

1437. *Koelipinia tenuissima* N. Pav. et Lipsch. sp. n. hoc loco.—
Кельпиния тончайшая.

K. linearis auctt. fl. turkest. (non Pall.) p. p.

Plantula gracilis, tenuissima, foliis angustissimis, filiformibus, ad 0.5—1 mm lt., capitulis minutissimis, involucris 2 mm lg., flosculis eis parum superantibus, achaeniis dorso sparse muricatis, saepe subglabris ab omnibus speciebus generis, imprimis ab *K. linearo* Pall., facile differt.

Typus sp., olim. prov. Syr-Darja, distr. Kzyl-orda (olim. Perovsk) in desertis argyllosis Darjalyk-takyr ad viam inter pago Aman-tasch et puteum Koldyn-kuduk. 11 VI 1929 fl. et fr. lg. S. Lipschitz, exs. № 29 (cons. in Hb. Univers. Mosq., Hb. Horti Petrop.).

Hab. in desertis argyllosis salsis Kasakstaniae australis, olim. prov. Syr-Darja, Turgai, Ssemireczje (Heptapotamia).

Новое растение, встречается в злейших солонцеватых глинистых и каменистых пустынных степях по югу страны, в Иргизск. и Тург. районах. Общий ареал этого вида покамест еще не изучен, однако простирается на пустыни южного Казахстана и, вероятно, заходит в Иран. Растение наблюдается с трудом, ибо обитает в пустынейших условиях, а кроме того обладает крайне быстрой и ранней вегетацией. Цв. IV—V.

В роде *Koelipinia*, до последнего времени считавшемся неделимым и заключавшем, по мнению многих авторов, единственный вид с наименованием Палласа, на самом деле различаются 4 превосходных вида, обладающих следующими разграничительными признаками и своеобразною географией:

1. Цветоложе с редкими щетинками; корзинки крупные, язычковые цветки 15—20 мм дл., в 2—2.5 раза длиннее листочков обертки *K. macrantha* C. Winkl. (Бухара, Туркменистан).
— Цветоложе голое; корзинки более мелкие, язычковые цветки не длиннее 8 мм, во время цветения едва превышают листочки обертки 2.
2. Листья линейные, не шире 2 мм, однонервные 3.
— Листья ланцетные, 3—5 мм шир., с 3 нервами . *K. latifolia* C. Winkl. (Предгорья южного Казахстана и Туркестана).
3. Обертки корзинок во время цветения 4—5 мм дл.; листья линейные, 1—2 мм шир.; семянки по спинке равномерно-шиповатые *K. linearis* Pall. (Юго-восток Европейской части СССР, пустынные степи северного Казахстана).
— Обертки корзинок 2—2.5 мм дл.; листья нитевидные, 0.5—1 мм шир.; семянки голые или с редкими рассеянными шипиками по спинке *K. tenuissima* N. Pav. et Lipsch. (Пустыни южного Казахстана и Туркестана).