

Habitat in humidis subalpinis montium Pamiralaj occidentalis (Asia Media).

Т у р u s: Долина реки Турган-Дарья. (Ширабад-Дарья) выше кишлака Кинталя. Заболоченный берег. 1931.VII.31 fl. et fr. Меркулович. (Herb. Univers. As. Med. n°127811).

5. *Serratula lancifolia* Zak. sp. n. in herb. — Perennis. Caules numerosi, erecti, stricti, 20—30 *cm* alti, tenues, glabri, sub capitulo vix arachnoidei, foliosi, simplices monocephali vel in triente superiore vix ramosi. Folia tenuiter coriacea utrinque viridia, glabra, integra integerrima vel rarius sinuato-dentata, basalia et caulina inferiora petiolata, lanceolata, apice obtusiuscula; cetera ad caulis apicem versus sensim decrescentia, angusto-lanceolata, sessilia, basi apiceque attenuata. Capitula 20 *cm* longa et 8 *mm* lata, oblonga basi rotundata. Involucry phylla numerosa, arcteappressa, coriacea, apice rotundata, mucronulata, nervis 2—3 atrofusis percursa margine arachnoidea, ab exterioribus ovatis ad inferiora lanceolata accrescentia, intima exserta, 15—16 *mm* longa, lanceolata, dorso breviter hispida. Receptaculi setae laeves. Corolla rosea. Achaenia juvenilia glabra.

*S. sogdiana* Bge affinis, sed foliis integris integerrimis vel rarius sinuato-dentatis differt.

Habitat in regione media montium in valle fl. Kaschka-darja (Asia Media: Pamiralaj).

Т у р u s: Катар-булок. Кашка-Дарья. 1936.VII.6 fl. Файзиев. (Herb. Univers. As. Med.).

6. *Koelpinia turanica* Vass. sp. n. — Planta annua. Caules rigidi ramosi adscendentes pilosuli usque 20—30 *cm* lg. Folia linearia vel anguste linearia, (1)—1,5—2,5—(3) *mm* lt. unicostata. Calathidia longepedunculata (peduncula 1 *cm* lg. vel longiore), calathidium medianum brevipedunculatum peduncule lanatulo. Involucry phylla lineari-lanceolata p. m. lanata; phylla interna 5—8—(10) *mm* lg. phyllis externis 2—3-plo longiora. Flosculi involucrum paulo superantes corolla albescente (in sicco!). Achaenia p. m. curvatula vel recta incrassata apice gradatim paulo angustata, 15—25 *mm* lg., pilosula vel glabra, summo apice setis hamatis stellatim dispositis instructa superficie extera setulis hamatis sparsis vel seriebus aculeusculorum breviorum vel tuberculis minutis conspersa.

*K. linearis* Pall. affinis, sed acheniis paulo curvatis vel rectis rigidis incrassatis apice gradatim angustatis setis brevioribus sparsis vel tuberculis instructis differt.

Habitat in desertis, in arenosis vel declivibus lapidosis Asiae Mediae.

Т у р u s: Репетек (Кара-Кумы). 5.V.1909 fl. et fr. Гольбек (Inst. Bot. Ac. Sc. URSS). Vassilczenko.

7. *Koelpinia leiocarpa* M. Pop. sp. n. (cf. Тр. Узб. Гос. Унив. Н. с. 27. Биолог. 14 (1941) 88 (ross.) — Annua. Caulis a basi ramosus, tenuiter araneosus vel glaber, foliosus, 15—25 *mm* longus. Folia filiformia conduplicata. Capitula longepedunculata. Involucry phylla exteriora lineari-subulata interioribus lineari-lanceolatis 4—5-plo breviora, omnia tenuiter araneosa. Ligulae luteae (?). Achenia vix curvata apicem versus angustata, laevia vel in parte inferiore tuberculis vel aculeolis paucis instructa, 12—13 *mm* longa.

*A. tenuissima* N. Pavl. et Lipsch. acheniis omnibus laevibus vel solum in parte inferiore tuberculis vel aculeolis paucis instructis differt.

Habitat in montibus Pamir-alaj (Asia-Media).