

curvata. *Pappus* sessilis, paleaceo-aristatus, capillari cinctus; in feminibus *marginalibus* brevissimus.

REC. nudum.

\* 1243. HEDYPNOIS. \* *Tournef.* 271. *Rhadioloïdes Vaill. A. G.* 1721. 29. 30.

CAL. *Communis* calyculatus, cylindræceus, subdecaphyllus, persistens: *squamis* linearibus, erectis, acutis, æqualibus; *basi* calyculatus *squamis* paucioribus, angustioribus, brevibus, arctis.

COR. *Composita* subimbricata, uniformis: *Corollulis* hermaphroditis, multis.

*Propria* monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinquentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindræcea, tubulosa.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, reflexa.

PER nullum. *Calyx* *communis* induratus, connivens, subglobosus, *squamis* femina marginalia obregens.

SEM. solitaria, oblongiuscula, subincurvata, striata, scabriuscula, longitudine calycis.

*Exteriora* coronata *Calyculo* membranaceo, erectiusculo, obsolete quinquangulati, denticulato. *Pappus* nullus.

*Interiora* coronata *Calyculo* obsoleto, multiseti, brevissimo, intra quem *Pappus* e *Paleis* quinque, erectiusculis, aristatis.

REC. nudum.

\* 1244. KRIGIA. † *Schreb.*

CAL. *Communis* simplex, cylindræceus, subdecaphyllus: *foliis* lanceolatis, erectis, acutis, æqualibus, corolla brevioribus.

COR. *Composita*, subimbricata, uniformis: *Corollulis* hermaphroditis.

*Propria* monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinquentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindræcea, tubulosa.

PIST. *Germen* subovarum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, reflexa.

PER. nullum. *Calyx* *communis* ovatus, tandem reflexus.

SEM. solitaria, pentagona, striata, coronata *Calyculo* mem-

branaceo, pentaphyllo, *foliis* subrotundis, erectis. *Pappus* capillaris e *Setis* quinque, cum *foliis* Calyculi alternantibus, longis.

REC. nudum.

1245. SERIOLA. \* *Gærtn.*. *Achyrophorus*  
*Vaill. A. G. 1721. f. 28. 13. 21. 18.*

CAL. *Communis* simplex: *foliis* linearibus, subæqualibus, erectis.

COR. *Composita* imbricata, uniformis. *Corollulis* hermaphroditis, æqualibus, numerosis.

*Propria* monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinque-dentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulosa.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, reflexa.

PER. nullum. *Calyx* immutatus.

SEM. oblonga, longitudine calycis. *Pappus* capillaris, stipitatus: *radiis* decem; lateribus pilosis.

REC. paleaceum, longitudine calycis, deciduum.

1246. HYPOCHOERIS. \* *Vaill. A. G. 1721.*  
*28. 21. -- Achyrophorus Gærtn.*

CAL. *Communis* subrotundus, imbricatus, basi ventricosus: *squamis* lanceolatis, acutis.

COR. *Composita* imbricata, uniformis: *Corollulis* hermaphroditis, æqualibus, numerosis.

*Propria* monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinque-dentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulosa.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, reflexa.

PER. nullum. *Calyx* connivens, globoso-acuminatus.

SEM. solitaria, oblonga. *Pappus* plumosus, stipitatus.

REC. paleaceum: *Paleis* lanceolato-linearibus, feminum longitudine.

OBS. H. glabræ *Semina* disci pappo stipitato: *Radii* pappo sessili. *Hall. R.*