

*Syn.* *H. maritima*. HELLEN. HORNEM. Fl. dan. 1261. (rigidissima) ROEM. SCHULT. I. p. 42. PRYTZ Fl. Fennica.

*Hist.* „Propæ Åbo“ cl. TENOSTRÖM.

*Obs.* Ex cl. PRYTZ, etiam folia submersa spatulata occurunt, forte in planta juniori.

LXXXVII. *Krigia tenella*: caulescens.  
RCHB.

*Hist.* 183. 184. In *Virginia missionarius* legit.

A. B. flosculi. C. receptaculum cum anthodio dimidio et semine (achenio). D. semen. E. id. transsectum. F. pappi squama. G. eiusd. seta. H. ead. magis aucta. I. anthodii squamae.

*Obs.* Species altera, *K. virginica*, acaulis est, et nostra propter folia opposita, membranabilis Cichoriaceae.

LXXXVIII. *Erythraea linearifolia*: foliis linearis-oblongis subuninerviis obtusis.  
RCHB.

*Syn.* *Centaureum minus Linariae folio*. TOUR. NEF. 122.

Cent. min. angusto praelongoque folio, fl. rubello. BARREL. 435.

Cent. min. leptophyllum polyanthes accenso acutoque flore. BARREL. 436. (status fructifer.)

Cent. minus purpureum angustifolium. BARREL. 423. (var. grandiflora.)

Cent. min. etc. BOCC. MUS. II. t. 43.

*Gentiana linariaefolia* LAM. ENC. II. p. 641.

*Chironia linearifolia*. LOIS. not. 155. REQ. in GUER. Vaucl. ed. 2. p. 252. DEC. fl. fr. Suppl. p. 428. n. 2781a.

*Erythraea linearifolia*. PERS! syn. I. p. 283. ROEM. SCHULT. IV. p. 170.

*E. uliginosa*. WALDST. KIT! 258. ROEM. SCHULT. IV. p. 163.

*Hippocentaura uliginosa*. SCHULT! Oestr. Fl. ed. 2. I. p. 389.

*Erythraea conferta* PERS! ROEM. SCHULT. IV. p. 168.

*Erythr. aggregata* THOUIN! H. P.

*Syn.* *H. maritima*. HELLEN. HORNEM. Fl. dan. 1261. (sehr steif) ROEM. SCHULT. I. p. 42. PRYTZ Fl. Fennica.

*Nachr.* Bei Åbo. H. D. TENOSTRÖM.

*Beob.* Nach PRYTZ kommen auch untergetauchte spathelförmige Blätter vor, wahrscheinlich an der jungen Pflanze.

LXXXVII. *Krigia tenella*: gestengelt.  
RCHB.

*Nachr.* In Virginien von einem Missionair gesammelt.

A. B. Blüthen. C. Fruchtboden mit halber Blüthenhülle und einem Saamen. (Achenium.) D. Saame. E. ders. durchschnitten. F. Schuppe des Pappus. G. Borste desselben. H. dies. mehr vergrössert. I. Hüllschuppen.

*Beob.* Die andre Art, *K. virginica*, ist stengellos, und unsre wegen der gegenüberstehenden Blätter, eine merkwürdige Cichoriacee.

LXXXVIII. *Erythraea linearifolia*: Blätter linienförmig-länglich, fast einnervig, stumpf. RCHB.

*Syn.* *Centaureum min. Linariae folio*. TOUR. NEF. 122.

Cent. min. angusto praelongoque folio, fl. rubello. BARREL. 435.

Cent. min. leptophyllum polyanthes accenso acutoque flore. BARREL. 436. (fruchttragend.)

Cent. minus purpureum angustifolium. BARREL. 423. (var. grandiflora.)

Cent. min. etc. BOCC. MUS. II. t. 43.

*Gentiana linariaefolia* LAM. ENC. II. p. 641.

*Chironia linearifolia*. LOIS. not. 155. REQ. in GUER. Vaucl. ed. 2. pag. 252. DEC. fl. fr. Suppl. p. 428. n. 2781a.


*Erythraea linearifolia*. PERS! syn. I. p. 283. ROEM. SCHULT. IV. p. 170.

*E. uliginosa*. WALDST. KIT! 258. ROEM. SCHULT. IV. p. 168.

*Hippocentaura uliginosa*. SCHULT! Oestr. Fl. ed. 2. I. p. 389.

*Erythraea conferta* PERS! ROEM. SCHULT. IV. p. 168.

*Erythr. aggregata* THOUIN! H. P.



*Krigia tenella*, RCHB. —