

lineares aequans; albus, akoenio immaturo, compresso cylindrico, vix rostrato longior.

Corea: Quelpaert, in littore Hamtok, 10 sept. 1908 (Taquet, 1043).

295. *Lactuca Nakaiana* Lévl. et Vant., nov. spec.

Radix fibrosa; caulis 90—1,10 m altus, erectus, glaber; folia laciniato-partita, segmentis sat latis, glabra; superiora anguste lanceolata, integerrima; inflorescentia elongatissima 25—35 cm, paniculata, bracteis multis sed minutis; capitula mediocria; bracteae involucrales anguste lanceolatae, obtusae; calyculo brevissimo, bracteolis obtusis; akoenia nigra compressa lucida, costata; nunc in rostrum elongata nunc tantum attenuata; pappus albus akoenium subaequans.

Corea: Quelpaert, in silvis Mokan, 18 sept. 1908 (Taquet, 1056).

296. *Lactuca alliariaefolia* Lévl. et Vant., nov. spec.

Radix crassa, perpendicularis; caulis erectus, flexuosus, glaucescens, striatus, 60—90 cm altus; folia *Alliariae officinalis* sed glabra, petiolo et nervo primario spinuloso; inflorescentia laxa paniculata, bracteis minutis et numerosis munita; capitula mediocria, pedunculis 3—4 bracteolata; flores lutei; bracteae involucrales et bracteolae calyculi curti brunneae, lanceolatae obtusae margine hyalinae; akoenia brunnea compressa ovalia, utrinque 3—5. valliculo-costata; pappus albus akoenia subaequans.

Corea: Quelpaert, in silvis Hallaisan Yengsil, 1200 m, 17 août 1908 (Taquet).

297. *Lactuca Taraxacum* Lévl. et Vant., nov. spec.

Pulcherrima planta; folia omnia radicalia runcinata, ampla; petiolo 5—6 cm longo, costato, angulato, villosulo; limbo 20—25 × 4—5 cm, villosulo lacerato; scapus 60 cm altus, striatus, puberulus; inflorescentia laxissima et remotissime florifera, saltem in parte inferiore; capitula parva; bracteae involucrales virides, acutae; calyculi brevissimi bracteolae acuminatae; akoenia brunnea striata incurva, compressa, elliptica; pappus albus paulo longior.

Corea: Quelpaert, in agris Hongno; oct. 1908 (Taquet, 1042).

298. *Solidago virga aurea* L. var. *Taquetii* Lévl., nov. var.

Forma praeclara foliis plantagineis ovato-spatulatis, petiolo alato quam limbus longiore.

Corea: Quelpaert, in herbis Hioton, 22 août 1908 (Taquet, 9407).

299. *Sonchus Taquetii* Lévl., nov. spec.

Caulis debilis, prostratus, vel radicans, fistulosus, glaber 40—50 cm longus; folia radicalia et inferiora cito decidua; caulinaria sessilia vel amplexicaulia, glabra, obtusissima, irregulariter sed parce lobata, minute dentata; abrupte decrescentia; inflorescentia tum terminalis nuda corymbosa, tum axillaris foliata et laxissime spicata; capitula magna, foliola involucri plurima imbricata araneosa; pedunculi nudi vel 1—2 bracteolati; flores lutei; akoenia immatura cylindrica, brunnea; pappus sordide albus.

Corea: Quelpaert in littore Henksatong, 14 sept. 1908 (Taquet, 1045)

300. *Boottia Bodinieri* Lévl. et Vant. (*Hydrocharis Bodinieri* Lévl. et Vant. in Fedde, Repert., V [1908], p. 10).

Corée: Route de Chemulpo à Saoul: rizières, marécages, 13 sept. 1889 (Ém. Bodinier).