

hispidi. Flores magnitudine et colore praecedentis: calycibus glabris. Haberem pro S. foliis lanceolatis sessilibus denticulatis caulibus hispidis Gmel. fib. 2. p. 12. n. 12. t. 4. f. 1, nisi calyces essent glabri.

1584. SONCHUS *prenanthoides*.

S. pedunculis squamatis viscosis, calycibus glabris, racemo terminali composito elongato, foliis ovato-oblongis basi lyrato-runcinatis attenuatis.

Habitat in Caucasi sylvis altioribus. Floret Julio, Augusto. 2

*Caulis* simplicissimus bipedalis fulcatus villosus. *Folia* magna lata denticulata non acuminata basi runcinata: inferiora sublyrata in petiolum marginatum denticulatum attenuata. *Panicula* terminalis racemosa composita conferta elongata viscida. *Flores* magnitudine *Prenanthis* purpureae: *corollulis* coeruleis.

394. LACTUCA. Receptaculum nudum. Calyx imbricatus, cylindricus: margine membranaceo. Pappus simplex, stipitatus. Semina laevia.

1585. LACTUCA *altissima*.

L. foliis denticulatis glabris: imis sinuatis, superioribus lanceolatis sagittatis acuminatis, paniculâ ramosissimâ subcorymbosâ.

Habitat ad rivulorum margines, prope Caucasi acidulam Narzana. Floret aestate.

*Planta* glabra orgyalis et ultra: *ramis* floriferis plurimis paniculatis subcorymbosis. *Folia* pleraque indivisa lanceolato-sagittata exquisite acuminata denticulata. *Flores* magnitudine L. sativae: *corollulis* luteis. *Semina* nigra. A L. sagittatâ differt *foliorum* denticulis majoribus et lobis baseos multo longioribus

acutioribusque: a *L. angustana*, cui habitu magis similis, foliorum dentibus non ciliatis et seminibus nigris.

1586. *LACTUCA Scarfola*.

*L.* foliis verticalibus carinâ aculeatis apice acutis, basi sagittatis, runcinato-pinnatifidis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1526. Hall. hist. n. 14. Pall. ind. taur. Habl. taur. p. 160.*

*L.* siluestris sine *Endivia* multis dicta, folio laciniato dorso spinoso. *J. Bauh. hist. 2. p. 1003.*

Copiosa in ruderatis et cultis. Floret Julio, Augusto. ☉

1587. *LACTUCA faligna*.

*L.* foliis carinâ aculeatis, radicalibus lanceolatis pinnatifidis: caulinis linearibus integerrimis sagittatis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1528. Jacq. austr. 3. p. 28. t. 250. Rupp. fl. jen. ed. Hall. p. 237, t. 4. Hall. hist. n. 13. Pall. ind. taur.*

*L.* virosa. *Habl. taur. p. 160.*

Frequens in sterilibus apricis, etiam in cultis. Floret Julio, Augusto. ☉

395. *CHONDRILLA*. Recept. nudum. Cal. calyculatus. Pappus simplex, stipitatus. Flosculi multiplici serie. Semina muricata.

1588. *CHONDRILLA juncea*.

*Ch.* foliis radicalibus runcinatis: caulinis indivisis, summis linearibus; caule basi hispido, calycibus laevibus.

*Ch.* foliis radicalibus runcinatis, caulinis linearibus integris. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1531. Jacq. austr. 5. p. 12. t. 427. Gmel. sib. 2. p. 8. n. 6. 7. Hall. hist. n. 17. Pall. ind. taur.*

*Prenanthes?* hispida. *Pall. it. 1. p. 501. upp. n. 126.*