

ruli. *Achaenia* anguste elliptica, uninervata, marginibus incrassatis, scabriuscula, statu maturo vulgo 3.5 mm. longa et 1.5 mm. lata nigricantiaque, rostro filiformi et 2 mm. longo; pappi setae interiores 5-5.5 mm. longae, scabriusculae, ad basin rufescentes, exteriores brevissimae.

DISTRICT DES LACS ÉDOUARD ET KIVU: Katanda, mont Mutangaisuba, alt. 1,150 m., savane, herbe vivace à souche pivotante, de  $\pm$  1.25 m. de haut, fleurons violets, sept. 1937, *Lebrun 7677\** (type).

*Observation.* — Cette nouvelle espèce est très distincte par sa grande panicule de capitules disposés en cymes bipares polycéphales contractées, caractère qui ne semble exister dans aucune des espèces africaines du genre.

*Lactuca attenuatissima Robyns* sp. nov.; ab affini *L. attenuata* Stebbins, foliis majoribus glabrisque, involucri bracteis interioribus glabris, corollis violaceis et achaenii rostro longiore valde difert.

*Caulis* scandens, ramosus, glaber, 1.5-3 mm. crassus et ut videtur basin versus tuberosus. *Folia* petiolata, cum petiolo insigniter alato et basi breviter auriculato, anguste lanceolata, cum petiolo 10-17 cm. longa et 1.5-2.5 cm. lata, pinnatipartita, segmentis lateralibus 2 vel 4 deltoideis reflexis et segmento terminali longissime attenuato, marginibus remote dentatis et dentibus mucronulatis recurvatisque, glabra vel glabrescentia. *Panicula* laxa ramosa, ramis ascendentibus, usque ad 40-45 cm. longa et 20 cm. lata, glabra. *Capitula* pedicellis gracilibus bracteolatis  $\pm$  curvatis inaequalibus 2-3 cm. attingentibus suffulta, anguste cylindrica, floribus exceptis, ad anthesin vulgo 8-10 mm. longa, ad maturitatem 12-15 mm. longa, 5-flora. *Involucri* bractee imbricatae, virides vel interdum marginibus leviter purpurascentibus, glabrae; exteriores lanceolato-ellipticae, subacutae, 2.5-3 mm. longae; interiores vulgo 5, lineares, subobtusae, 8-14 mm. longae. *Flores* vivo violacei; corolla in toto 13-14 mm. longa, tubo ad apicem minute pilosulo, ligula 8 mm. attingente; antherae exsertae, lineares, pallidae, vulgo 3 mm. longae; styli rami puberuli et 1-1.5 mm. longi. *Achaenia* anguste oblongo-elliptica, valde obcompressa, circa 9-costata et costis alatis minuteque scabriusculis, statu maturo castanea, vulgo 4 mm. longa et 1.3 mm. lata, rostro subfiliformi

subflexuoso et 1.1-1.2 mm. longo; pappi setae 6.5-7 mm. longae, scabriusculae, niveae, fragiles.

DISTRICT DES LACS ÉDOUARD ET KIVU: entre Kibumba et le Nyamuragira, alt. 1,800-2,000 m., forêt sclérophylle, dans la plaine de lave, herbe diffuse traînante ou grimpante, latex abondant, fleurons violets, août 1937, *Lebrun* 7059\* (type); entre le Mikeno et le Mushumangabo, alt. entre 1,650 et 1,850 m., forêt sclérophylle sur plaine de lave ancienne, herbe diffuse, traînante ou grimpante, capitules violacés, août 1937, *Louis* 4966\*.

*Jardin Botanique de l'État,*  
novembre 1943.

---