

Kouy-Tchéou: Route de Pin-Fa à Kouy-Yang, juin 1906 (Jul. Cavalerie, 3706).

425. *Lactuca Cavalieri* Lévl., nov. spec.

Planta glabra; caulis teres, robustus, striatus 1,50 m altus; folia late graminiformia uninervia 20—25 cm longa, 1 cm lata; inflorescentia late et longe paniculata; bracteae florales fuscae lineares, obtusae, margine hyalinae, flores lutei; akenia nigra compressa faciebus unicostatis; pappus rufus breviter pedicellatus, pedicello fulvo, disco angusto.

Kouy-Tchéou: Montagnes entre Ma-Jo et Long-Ly, 5 sept. 1907 (Jul. Cavalerie, 2908).

426. *Lactuca Beauverdiana* Lévl., nov. spec.

Planta elegantissima, glaberrima; caulis et rami angulati, striati; folia flaccida radicalia numerosa rosulata, in petiolum alatum longe attenuata, graminiformia; caulinarum angustissime lanceolata, sessilia acuminata, reticulata, integerrima, nervo primario vix ad medium folii subito sed non divaricate ramoso; inflorescentia gracillima, ampla, capitula minima 5—6 flora; bracteae florales 5 lineares; flores lutei; akenia fusiformia, valide striata, brunnea, compressa; pappus sordide albus, pedicello brunneo 1 mm longo.

Kouy-Tchéou: Kai-Tchéou, juin 1908 (Jul. Cavalerie, 3707).

427. *Lactuca Kouyangensis* Lévl., nov. spec.

Caulis 1—1,50 m altus, inconspicue striatus; folia caulinarum runcinata lobis et dentibus acuminatis, lata, ciliata triangulariter acuminata, amplexicaulia, acute auriculata; inflorescentia late et longe ramoso-paniculata; capitula pluriflora; bracteae florales lineares, acutae, margine hyalinae dein omnino refractae; akenia compressa, nigra faciebus tricostatis; pappus sordide albus longe pedicellatus; pedicello 5 mm longo.

Kouy-Tchéou: Kouy-Yang, assez rare, 20 oct. 1907 (Jul. Cavalerie, 3706).

428. *Sideritis ciliata* Thunb. var. *Mokpoensis* Vant., nov. var.

Differt a typo foliis et bracteis linearibus elongatis et non ovalibus. Folia 2—3 cm × 2—3 mm, punctuata sed non pellucide.

Corea: In herbis Mokpo, 25 sept. 1900 (Urb. Faurie, 805).

429. *Teucrium nepetoides* Lévl., nov. spec.

Caulis et folia *Melissae officinalis*; folia ovata, petiolata grosse dentata, subtus pallida; inflorescentia *Nepetae catariae*; bracteae puberulae acuminatae; calycis puberuli dentes obtusi; corolla roseo-rubra, odorata, lobo labii inferioris terminali lanceolato, staminibus longiore; stylo hamato, emarginato.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, 14 oct. 1902; mixtum cum duabus speciebus Calaminthae (Jul. Cavalerie).

430. *Calamintha Esquirollii* Lévl., nov. spec.

Caulis tomentellus, erectus, ramosus; folia dessiccatione caduca, petiolata suborbicularia, grosse crenata, puberula; inflorescentia nuda tomentella; verticilli numerosi, multiflori, racemosi; calyx curvatus, dentibus aequilongis, dente supremo latiore, acutis; corolla pulcherrima atro-vio-