

19.7, fl. (Corr. 1775), Asile, terreni aridi lungo il Meno, non troppo frequente, fiori rossicci, 27-28.7, fl. et fr. immat. (Corr. 1654, 1668, 2016-2019).

ECHINOPS BORANENSIS Lanza (1939) var. *MINOR* Cuf., var. n.

Tota planta 20 cm. vix superans, quam typus ergo multo humilior, foliis basalibus 12 cm. lo. et pinnis maximis 30 mm. lo. et 5 mm. la., glomerulo terminali sub anthesi 4-5 cm. diam., capitulis propriis paulo minoribus, squamis extimis setosis paucis, ad 5 mm. lo., squamis aculeatis nullis vel paucis, aculeis ca. 10 mm. lo., ideoque glomerulus subinermis.

Neghelli, 26-29.9, fl. (Corr. 1970).

CENTAUREA HOCHSTETTERI O. et H. ssp. *BORANENSIS* Cuf., ssp. n.

A typo discrepat foliorum laciniis angustioribus divaricatis, lobo terminali quam laterales plerumque vix majore, phyllis levibus vel parcissime scabris, parce lanatis, longius acuminatis, apice minus rigidis, compressis.

Neghelli, 24.4, 26-29.9, fl. (Corr. 2003, 1981, 1987), pozzi di Uacille, 25.9, fl. incip. (Corr. 1998), fra Uacille e Mega, 26.4, fl. (Corr. 1942), Mega, 8-24.9, fr. (Corr. 1738).

LACTUCA FARINULENTA (Chiov.) Cuf., comb. n.

Launaea far. Chiov. (1933) — *Launaea Cufodontii* Lanza (1939).

Ruscello di El Dire, Gondaraba, Sagan verso il lago Stefania, rive del Caschei presso Dandè, Nargi (Corr. exsiccata plurima).

LACTUCA BORANENSIS Cuf., sp. n.

Perennis, radice lignosa pluricephala, foliis omnibus plus minusve basalibus, subrosulatis. Caulis erecti, internodiis brevibus, ramosi, inferne tantum foliis nonnullis diminutis instructi, inflorescentias amplas, laxas, subdichotome-paniculatas, folia triplo quadruplove superantes, usque ad 20 mm. altas, ferentes. Folia glaberrima basalia runcinato-pinnatifida, lobis usque ad 15 mm. lo. et basi 5-8 mm. la., triangularibus, acutis, deorsum versis, inferioribus sensim minoribus, margine ubique irregulariter spinoso-dentatis, dentibus omnibus in aculeos albidos, cartilagineos, subulatos, subhamatos elongati, utrinque glabra, 30-100 mm. lo., petiolo dentato-alato, basi rotundato-dilatato et interdum aculeato-subauriculato. Inflorescentiae subdichotomo-ramosae, rami bracteis minutis, ovato-lanceolatis, acutis, scarioso-marginatis suffulti,

teretes, striati, glaberrimi. Pedicelli 5-10 mm. lo., graciles, apice bracteis in phylla transeuntibus perpaucis instructi. Involucri phylla externa bracteis simillima dorso fusca, apice subpuberula, margine late albide scarioso-marginata, in toto ca. 7, sursum gradatim majora, 1,5-3,5 mm. lo., ovata usque ovato-lanceolata, intima 5, inter sese aequalia sublinearia, 10 mm. lo. et 1 mm. la., apice subcucullata, obtusiuscula, dorso fusca et imprimis sursum, anguste scarioso-marginata. Flores in quoque capitulo 12, corollis ca. 14 mm. lo., ligulis luteis, quinquedentatis, 1-1,5 mm. latis, dentibus spathulato-obtusiusculis. Achaenia matura fusco-olivacea, lanceolata, apice breviter et grosse attenuata, disco pappifero terminata, 3,5 mm. lo. et supra medium 0,75 mm. lata, compressa, quadricostata, costis saltem trinerviis, ideoque, ob sulcos intercostales inconspicuos, multinervia, nervis, muriculato-asperulis, pappo piloso, niveo, molli, 5-6 mm. lo. Etsi achaenia nonnulla vacua similia sed pallida et graciliora, observentur, tamen nullomodo achaenia heteromorpha dici possunt.

M e g a , 8-24.9, fl. et fr. (Corr. 1736, 1877-79, 1906).

II. - COMPOSITAE. Ulteriori specie ed entità minori nuove dell'A. O. I.

SPHAERANTHUS BRACHYSTACHYS (O. Hoffm. in schedis Herb. Berol. et in Engler, Sitzungsber. Akad. Berlin, X, 382, 1904, in textu, nomen nudum.) Cuf. descr.

Herba elata, probabiliter basi suffrutescens, ramis axium praecedentium apices sympodialiter superfastigiantibus, subteretibus, striatulis, rubiginosis, pubescentibus, alatis. Folia sublinearia vel anguste lanceolata, utrinque attenuata, basi in alas angustas callose dentatas decurrentia, apice et margine similiter callose et irregulariter dentata, subundulata vel crispatula et interdum revoluta, sicut alae caulinae plus minusve dense hispidulo-pubescentia, usque ad 20 mm. lo et 5 mm. la., internodiis longiora. Glomeruli solitarii in apice ramorum terminales, sed propter ramos laterales elongatos pseudolaterales, pedunculis 1,5-3 cm. longis, alatis et sicut caules hispidulis, aphyllis, cylindrico-ovoides, usque ad 15 mm. longi et in sicco saltem 8 mm. diametientes, sub anthesi lilacini. Capitula numerosissima conferta. Bractee et phylla vix distinguenda, subsimilia, 10-12, spathulato-lanceolata, apice spinuloso-mucronata et purpureo-lilacina, margine et dorso ciliato-pilosa, caeterum integra, glaberrima, scariosa, ca. 2,5 mm. lo., externa latiora, interna angustiora. Flores foeminei 6-9, ovario piloso, 0,5 mm. lo., corolla vix dilatata, filiformi, 1,5 mm. lo., glabra, stylo bifido, longius exserto. Flores hermaphroditi 1-3, abortu ovarii masculi, ovario stipiti-