

Hab. ad radices montis *Demawend* Kotschy № 602.

Caules elati tripedales, folia intermedia 2-2 1/2 poll. longa 2 lin. lata. Habitus et capitulorum magnitudo *Ch. juncea* a qua differt foliis glabris, involucri phyllis aculeato-setosis nec glabris.

**LACTUCA BRASSICÆFOLIA** Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Scariola*.)

*L. glaberrima* glaucescens perennis, caule ascendentem elato tereti tenuiter striato supernè patulè ramosissimo ramis apice dichotomis, foliis subcoriaceis argutè denticulatis radicalibus caulinisque infimis indivisis ovato-oblongis in petiolum brevem attenuatis vel sublyratis segmentis lateralibus 2-4 parvis terminali ovato, caulinis ovatis parvis auriculæformibus sessilibus ovatis basi cordato-amplexicaulibus auri-culis rotundatis, capitulis ovatis brevissimè pedunculatis secùs ramulorum extremitatem 3-5 laxè dispositis, pedunculis ramisque breviter glandulosis, involucri phyllis glabris pallidis ab inferioribus trianguli-lanceolatis ad intima lanceolata sensim auctis, flosculis lutescentibus extùs rubellis involucrum non superantibus, achenio rufo lœvi compresso oblongo-lineari utrinquè sub 5 striato, rostro tenuissimo achenio multoties breviori, pappo niveo achenio paulò longiori.

Hab. in schistosis montis *Elbrus* propè *Derwend* Kotsch. № 442, in Persiâ Auch. № 486.

Caulis infernè pennâ anserinâ crassior bipedalis, folia inferiora 2-3 poll. longa 4-1 1/2 lata, capitula inter ea *L. sylvestris* et *L. perennis* magn. media ovata, achenium lin. 4 1/3, rostrum lineæ 1/3 longum. Species distinctissima propè *L. polycladum* collocanda.

**LACTUCA SCARIOLOIDES** Boiss. (Sect. *Scariola*.)

*L. biennis*, caulis glaberrimus albis tenuiter striatis supernè ramosissimis ramis dichotomis ramulisque elongatis strictis paniculam patentem laxam formantibus, foliis pallidè virentibus margine denticulato-spinulosis subtùs ad nervum medium aculeatis cæterùm glabris infimis basi attenuatis latè linearibus indivisis vel pinnatifido-runcinatis, superioribus a basi latissimè rotundato-auriculatâ amplexicauli ovato-oblongis acuminato-attenuatis plus minus lobatis, capitulis subsessilibus pedunculatisve oblongis parvis, involucri pallidè livescens glabri phyllis ab infimis triangularibus ad superiora lanceolata sensim