

Peiotaxis pulcherrima Steetz; *De Wild. Études Fl. Bas- et Moyen-Congo* I pp. 212 et 329.

Kayumba (Tanganika-Moero), 1905.

OBS. — Nom indigène au Moero : Bombo. — Herbe nuisible et non mangée par le bétail. En l'absence de fleurs cette détermination est toujours un peu douteuse.

Pleiotaxis rugosa O. Hoffm.; *De Wild. loc. cit.* p. 329.

Au sud de Tchitadi, 4 février 1905 (Éd. Lescauwaet, n. 322).

LACTUCA L.

Lactuca Cabrae De Wild. nov. sp.

Launaea Cabrae De Wild. nom. nov.

Petite plante herbacée, glabre, sauf à la base des rameaux et dans les aisselles des bractées, fleurissant sans feuilles au sommet d'une racine plus ou moins tubéreuse, parfois ramifiée et munie à son sommet de touffes de poils soyeux-brunâtres. Tiges ramifiées atteignant 6-7 cm. de long, capitule compris, munies vers le milieu et à la naissance des ramifications, de bractées espacées, ovales-lancéolées, linéaires vers le sommet. Feuilles basilaires inconnues, capitules fleuris atteignant environ 2 cm. de long, à bractées externes beaucoup plus courtes que les internes, glabrescentes ou ciliées, les internes de 10-14 mm. de long, brunâtres à l'état sec, à bords scarieux, au nombre de 8, linéaires-lancéolées, subaiguës, glabres. Fleurs jaunes. Akènes, sans bec, de 3 mm. environ de long (mûr?), à soies blanches de 11 mm. environ de long.

Savane sur la crête du Vanda (Bassin de la Pozo), en terrain rocailleux, 15 octobre 1901 (Mission Cabra-Michel, n. 62); Région de Lumene, 1903 (leg. R. P. Hendrickx, coll. J. Gillet, n. 3278); Sanda, 1903 (leg. Odon, coll. J. Gillet, n. 3210); Sabuka, 19 octobre 1903 (Ém. et M. Laurent).

OBS. — Cette plante est très particulière elle fleurit probablement avant de donner ses feuilles. Les rameaux florifères nombreux naissent d'une racine tubérisée allongée rameuse, dont le sommet est garni d'une forte touffe de poils soyeux. Par les divers caractères que nous avons rappelés plus haut le *L. Cabrae* se rapproche du *L. goraeensis* Lam. (= *Launaea goraeensis* O. Hoffm.). Cette dernière espèce, quoique très variable, n'a jamais été signalée sous une forme aussi réduite; notre *L. Cabrae* s'en différencie d'ailleurs par les dimensions des diverses parties du capitule, par la longueur des soies, etc.

Lactuca capensis Thunb. Prodr. Pl. Cap. (1800) p. 139.

— — *duruensis* De Wild. nov. var.

Plante herbacée, atteignant plus de 1 mètre de haut. Tiges cylindriques, plus ou moins striées. Feuilles basilaires inconnues; feuilles caulinaires et supérieures linéaires, lancéolées, aiguës, entières, sessiles, semiamplexicaules, biauriculées à la base,