

imbricatis externis paucis acutis internis 8-10 linearibus obtusis, flosculis lilacinis. acheniis elongato-ellipticis compressis utrinque 5-6-striatis subcarinatis apice attenuato in rostrum concolor eo 6-8-plo brevius abeuntibus ♂.

Hab. in quercketis ad pagum Koweg prov. Musch Armeniæ australis 5000' (Ky. 501!).

Planta pluripedalis, folia inferiora cum petiolo plus quam pedalia superne tres pollices lata. Capitula magnitudinis *Mulgædii Alpini*; facies *Mulgædii* potius quam *Lactucae*, sed ob achenia evidenter et subabrupte quamvis breviter rostrata huic generi adnumeranda.

24. **L. mulgediooides** (Boiss. et Ky. exs. 1859) glaberrima, radice præmorsâ brevi, caule elato tereti albidò striato folioso superne breviter et composite corymboso-paniculato, foliis infimis..., caulinis sessilibus supra basin ovatam latissime et rotundatim auriculatam in segmenta 2-5 basi confluentia ovata mucronata acute denticulata pinnatipartitis, supremis ovatis amplexicaulibus, floralibus minimis squamæformibus ovatis, capitulis 15-16-floris mediocribus ovatis, involueri glaberrimi livescentis phyllis imbricatis obtusiusculis ab infimis ovatis ad intima late linearia sensim auctis, flosculis (e sicco) lilacinis, acheniis compressis oblongis utrinque 7-8-striatis apice seabridis in rostrum concolor eis quadruplo brevius attenuatis ②.

Hab. in rupestribus graminosis vallis Teng prov. Musch Armeniæ 6500' (Ky. 4561), in monte Jyldisdag Anatoliae borealis (Wied!).

Tripedalis, folia caulina inferiora 4-5 poll. longa 2 lata, involucrum floriferum sex lineas longum, achenium cum rostro trilineare.

25. **L. Cataonica** (Boiss. et Haussk.) radice præmorsâ, caule tereti erecto glabro inferne folioso superne striete et anguste paniculato, foliis subtus pallidioribus sparsim et crispule piliferis inferioribus in petiolum basi sensim dilatatum abeuntibus, intermediis basi late et obtuse auriculatis omnibus lyrato-pinnatisectis segmento terminali triangulari-deltoideo acuto lateralibus utrinque 2-3 oblongis omnibus minute et acute denticulatis, foliis supremis oblongo-lanceolatis amplexicaulibus integris, capitulis secus paniculæ ramos paucis approximatis brevissime pedicellatis oblongo-cylindricis 8-10-floris, involueri glabri phyllis nigro-sphacelatis ab externis oblongo-lanceolatis ad interna linearia auctis apice demum subpatulis. flosculis cœruleis, acheniis linear-lanceolatis aspero-hirtellis compressis utrinque subseptemcostatis apice in rostrum breve concolor ab achenio indistinctum disco ciliolato terminatum longe attenuatis ♂.

Hab. in sylvis populneis montis Berytdagh Cataoniæ (Haussk. exs. sub *Ceph. Kotschyi*).

Pedalis vel elatior, foliorum inf. segmentum biplicare et longius. Habitu et capitulorum magnitudine affinis *L. deltoidea*, foliis teneris, segmento terminali 3-5-partito, flosculis luteis, acheniis facie internâ carinatis apice non longius sed abruptius albo-rostratis distinctæ. *L. mulgediooides* affinis quoque differt glabritie, capitulis latioribus plurifloris, involueri phyllis latis.